

106學年度健康小學堂益智搶答(選擇題)試題答案修正

題號	題目	選項A	選項B	選項C	選項D	解答	解釋
85	完整版急救流程中，按壓與吹氣的比率為？	5比1	15比2	30比2	60比2	C	完整版(雙人版)且為醫護人員急救流程，按壓與吹氣比率為15比2
86	一氧化碳是無色無味無臭的氣體，常因燃燒不完全造成，中毒原因是一氧化碳極易與血液中的甚麼作用？	白血球	紅血球	血小板	血漿	B	
90	下列何者為運動傷害的處置注意事項？	勿推拿，以免患處血腫或出血，使症狀惡化	運動前須先暖身，結束前作緩和運動來預防傷害	發生運動傷害之初始急性期，72小時以內，以冰敷為宜	以上皆是	D	
92	牙齦出血的處理何者錯誤？	在出血的牙齦上墊上夠厚的護墊並咬住至少10-20分鐘	漱漱口保持口腔清潔	止血後12小時避免喝熱飲	如流血不止或再出血則要找牙醫治療	B	不要漱口，以免破壞血凝塊
93	有關簡易急救箱應常備的器材下列何者不正確？	急救箱應放在安全乾燥處	家裡的餅乾盒或食品罐可廢物利用作為簡易急救箱	簡易急救箱應常備耳溫槍或體溫計	簡易急救箱的消毒紗布應保持在有效期限內	B	急救箱最好不要用空餅乾盒或食品罐，以防幼兒誤食。
95	急救時檢視傷患，協助傷患保持合適姿勢，以下何者為非？	心臟病或氣喘發作者宜採平躺	下肢受傷或休克者應抬高下肢	昏迷意識不清者採取復甦姿勢	懷疑脊椎損傷，應用長背板固定搬運	A	心臟病或氣喘發作者宜採半坐臥或坐姿。
140	有關預防糖尿病的發生，下列何者錯誤？	良好生活習慣	適當飲食	適量運動	服用降血糖藥物	D	服用降血糖藥物屬於治療非預防