

106年度健康小學堂(是非題)

| 題號 | 題目 | 解答 | 解釋 |
|----|--|----|--|
| 1 | 人口販運加害人都是陌生人，不會是自己的親戚或是朋友？ | X | 不一定，人口販運加害人可能是陌生人，也可能是熟悉的人。 |
| 2 | 精神病患者都是有暴力傾向、隨時會傷害別人的危險人物 | X | 有暴力行為的精神病患者佔病患者總人數不到5%，多數由於缺乏適當的治療所致。大部份的精神病患者都是比較被動、內向、退縮的。如能定時覆診服藥，加上專業人員的輔導及照顧，則更為安全。 |
| 3 | 憂鬱症患者常會出現無助無望感，所以憂鬱症患者比一般人更容易出現自殺行為。 | 0 | 很多自殺患者在生前皆有精神方面的困擾，自殺與精神疾病有很大的相關，據統計憂鬱症患者最後死於自殺者佔15%。 |
| 4 | 在靜水或激流中，投擲救生繩袋時，落點最好要超過溺者到其身體的後方，且伸手可及或近處，救者可在岸上收拉繩索或移動位置，以讓繩索靠近溺者，能捉住繩索或繩袋。 | 0 | |
| 5 | 最佳之救援方式，是以施行救者不下水的岸上救援為最高安全指導原則。 | 0 | 務必遵照叫叫伸拋划，救溺先自保準則 |
| 6 | 「徒手」、「物援」、「拋擲」、「涉水」皆為基本救生之方法。 | 0 | |
| 7 | 藥物廢棄物檢收站所收集的藥物廢棄物中以感冒治療藥物為大宗。 | X | 藥物廢棄物檢收站所收集的藥物廢棄物中以心血管、高血壓、高血脂、糖尿病治療藥物為最多。 |
| 8 | 小明的爸爸到國外出差，因生病掛急診，回國可申請健保費用核退 | 0 | 具健保身分者，在國外或大陸地區，臨時發生緊急的傷害、生病或分娩而就醫者，回國可申請健保費用核退。 |
| 9 | 特約醫院或診所對保險病人的處方用藥，每次開給以不超過七日份的用量為原則。 | 0 | 特約醫院或診所對保險病人的處方用藥，每次開給以不超過七日份的用量為原則，對慢性病人一次開給三十日以內的用藥量。 |
| 10 | 健保IC卡外顯的資料有照片、出生年月日、身分證字號及電話號碼。 | X | 健保IC卡外顯的資料有姓名、照片、出生年月日以及身分證字號。 |
| 11 | 生病時去看醫師，為了不要打針吃藥，我儘量不跟醫師說哪裡不舒服。 | X | 明確說明症狀與病情有助醫師診斷與治療 |
| 12 | 看診時應穿著容易穿脫的衣物，以方便醫師診察。 | 0 | 千萬不要盛裝打扮，穿著容易穿脫的衣物，女性病患千萬不要穿著連身衣服，而且不要上妝為宜，以方便醫師診察。 |
| 13 | 看病拿藥，藥愈多愈好，才划算。 | X | 不僅浪費健保資源，亦會增加身體負擔。 |
| 14 | 為避免健保資源之不當使用，健保署推動以病人為中心之整合性照護，以減少看診次數及整合病人用藥情形。 | 0 | |
| 15 | 罐頭如果表面出現膨大的現象，表示罐頭壞掉了。 | 0 | |
| 16 | 對於前一年門診就醫次數大於100次者，健保署將優先列為高診次輔導對象，以避免重複就醫，造成健保資源浪費。 | 0 | |
| 17 | 福壽膏是鴉片在清朝時的別名 | 0 | 鴉片，舊時叫做洋藥，俗稱大煙、阿芙蓉，清朝時期普遍叫做福壽膏 |

106年度健康小學堂(是非題)

| 題號 | 題目 | 解答 | 解釋 |
|----|---|----|--|
| 18 | 安非他命、搖頭丸屬第二級毒品，施用後會使人的心境、意識、視覺、行為發生變化，嚴重時會出現焦慮、恐慌、精神分裂、昏迷甚至死亡，千萬不要吸食。 | 0 | 安非他命與搖頭丸長期使用會造成依賴性及成癮性，甚至會出現妄想型精神分裂症，症狀包括猜忌、多疑、妄想、情緒不穩、易怒、視幻覺、聽幻覺、觸幻覺或重複性的行為及失眠等。當施用過量時，會出現心律不整、脫水及急性腎衰竭等症狀，嚴重者可能導致死亡。 |
| 19 | 毒品具有成癮性、耐受性，也就是對毒品會產生依賴性，毒品用量愈來愈多，吸毒者為購買毒品耗盡家財或衍生犯罪問題，嚴重影響社會治安。 | 0 | 成癮性：經常從事一種行為，會影響身心健康、人際關係及生活作息。 耐受性：必須攝取更多劑量才能獲得相同的效果。 |
| 20 | 政府為宣示反毒決心而推動的運動，我們稱之為「紫蘭花運動」。 | X | 馬總統於101年6月2日出席101年反毒會議之反毒博覽會時，在民間團體、教育部蔣部長及總統傳遞揮舞「紫錐花運動」旗幟，宣示「紫錐花運動」，由校園推向社會，由國內推向國際，全球一起來，並爭取國際認同此一反毒意象及作為永久反毒代稱。 |
| 21 | 朋友在遊樂場將一包安非他命交給我，我還沒有施用之前，即遭員警查獲，這樣是沒有刑事責任的。 | X | 持有第二級毒品者，處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣三萬元以下罰金。 |
| 22 | 關於毒品「戒斷症候群」代表著停藥後身體會感到痛苦萬分。 | 0 | |
| 23 | 一旦染上毒癮，心理層面的癮容易戒除，但生理的癮難除。 | X | 身體所產生的戒斷症狀，約2週就可排除，但心理成癮的部份可能需要一輩子努力。不論是生理或是心理的依賴性，都是需要時間與專業人士協助戒斷毒癮。 |
| 24 | FM2為藥錠的形式，是強力安眠藥，近年來被歹徒作為強暴犯罪工具，又有人稱之為「強姦藥丸」。 | 0 | FM2溶解後無色無味安眠作用快速(20分鐘)，作用強(為一般安眠藥的十倍)，安眠效果久(8-12小時)，會讓人有嗜睡、近期記憶喪失等症狀，高劑量會產生深度昏迷，故稱之為強姦藥丸。 |
| 25 | 只是讓別人寄放毒品在自己這邊，還不算犯法。 | X | 毒品危害防制條例第11條、第11條之1，有規定持有毒品罪。 |
| 26 | 顏色越紅的肉，鐵質含量較多。 | 0 | |
| 27 | 不管用任何方式使用K他命都會對膀胱造成危害 | 0 | 藥頭常會以錯誤的訊息誘騙民眾吸食K他命，但不論何種吸食方式只要長期使用K他命，就會造成腦部損傷、膀胱容量萎縮 |
| 28 | 新興毒品「鱷魚」正式學名為「二氫去氧嗎啡」，其藥效類似安非他命。 | X | 其藥效類似海洛因，施打的人會出現皮膚腐爛、骨肉分離，表皮變成綠色的鱗片等副作用喔。 |
| 29 | 食品標示的"成份"這個項目內應包含食品添加物。 | 0 | |
| 30 | 白開水沒有味道且不好喝，應多喝含糖飲料。 | X | 白開水是人體最佳的水分來源，應養成喝白開水的習慣。市售飲料含糖量高，經常飲用不利於健康。 |

106年度健康小學堂(是非題)

| 題號 | 題目 | 解答 | 解釋 |
|----|--|----|---|
| 31 | 正常眼球的裸眼視力應有0.9或以上。 | 0 | |
| 32 | 體重60公斤以上的人最多可捐血500CC。 | 0 | 全血捐血每次以250ml為原則,但體重60公斤以上者,每次可捐血500ml。 |
| 33 | 蔬菜類的營養小子維生素B,可以讓我們的視力變好。 | X | 維生素A是構成視紫質的基本元素,可預防夜盲症。還有幫助眼睛製造淚液的功能,補充維他命A,還可預防乾眼的症狀。 |
| 34 | 看電視時,應該要保持螢幕對角線6-8倍的距離觀賞,才不容易近視。 | 0 | 應保持螢幕的對角線6-8倍的距離。 |
| 35 | 吸菸者體內的一氧化碳含量越高,表示身體缺氧情況越嚴重 | 0 | |
| 36 | 我國菸害防制法規定20歲以下青少年吸菸,需要接受戒菸教育 | X | 未滿18歲者,不得吸菸 |
| 37 | 電子菸是一種合法的戒菸藥物。 | X | |
| 38 | 吸菸容易導致癌症,無論是肺癌、口腔癌或是腎臟癌。 | 0 | |
| 39 | 菸草中尼古丁具成癮性,經由肺部黏膜吸收後直接作用於中樞神經系統會,對情緒和認知功能產生影響。 | 0 | |
| 40 | 在學校密閉的廁所裡面是可以抽菸的 | X | |
| 41 | 小黑到醫院探病時,雖然醫院圍牆內全面禁菸,但圍牆外的室外場所則無所限制。 | X | |
| 42 | 使用一氧化碳濃度測量儀時,未吸菸者分數應為0分。 | X | 當CO值小於6 PPM屬正常值 |
| 43 | 百萬國小的警衛在警衛室中抽菸,是應該要被禁止的。 | 0 | |
| 44 | 當有抽菸衝動時,可透過快速呼吸或是慢慢喝杯熱開水,可以降低抽菸衝動。 | X | 可作深呼吸動作 |
| 45 | 小天旅社老闆為了讓癮君子有吸菸的環境,在旅館內設置吸菸室,以解決菸癮。 | 0 | 老人福利機構(如老人安養院)、旅館、商場、餐飲店等地,是菸害防制法例外允許設置室內吸菸13室的場所。 |
| 46 | 小麥有養心安神的作用,對失眠有幫助。 | 0 | 小麥有養心安神的作用,對失眠有幫助。 |
| 47 | 吸食淡菸對身體的危害比吸一般香菸為少,所以小美吸食淡菸對身體無害。 | X | |
| 48 | 阿華昨天被蚊子叮咬,想到前幾天有人說愛滋病毒會透過血液傳染,而蚊子會吸血,所以蚊子會傳染愛滋病毒? | X | 愛滋病毒的主要傳染途徑是性行為、血液或母子垂直傳染,因此被蚊子叮咬並不會感染愛滋病毒。 |
| 49 | 花輪告訴小丸子說:結核桿菌只會感染人體的肺部器官,所以只要照胸部X光檢查就可以了。 | X | 結核病是由結核桿菌引起的一種傳染病,結核菌侵入人體後可在任何器官引起病變,如肺、腦膜、淋巴腺、骨骼、腸、泌尿及生殖器官等。但因結核菌在繁殖時需要氧氣,所以大多會在肺內,尤其是會在肺葉上半部繁殖,所以在結核病中肺結核佔9成。 |
| 50 | 海綿寶寶近期到醫院做餐飲人員年度健康檢查,糞便檢驗出帶有傷寒桿菌,但是海綿寶寶表示身體並沒有不舒服的症狀,請問海綿寶寶現在是否可以繼續廚師工作? | X | 無症狀的傷寒桿菌帶原者仍有可能透過汙染水或食物造成其他人感染,尤其是餐飲人員經檢驗確定感染傷寒桿菌,不論有無症狀皆應立即暫停餐飲相關工作,並儘速就醫由醫師診斷治療,待糞便或相關檢體檢驗確認為陰性才能恢復工作。 |

106年度健康小學堂(是非題)

| 題號 | 題目 | 解答 | 解釋 |
|----|--|----|---|
| 51 | 中秋佳節大家團聚烤肉，海綿寶寶不小心吃了沒煮熟的淡水螺類，請問食用淡水螺類是否會感染「中華肝吸蟲」？ | X | 食用淡水螺類（第一中間宿主）並非中華肝吸蟲的感染途徑。生吃、未完全熟食鯉魚、鯽魚、吳郭魚等淡水魚類第二中間宿主才會。 |
| 52 | 小陳在看電視的時候，節目主持人介紹：「旋毛蟲病是一種寄生於肌肉的寄生蟲疾病，人類感染旋毛蟲主要是因為食入未完全煮熟的魚肉」，請問是否正確？ | X | 旋毛蟲病是一種寄生於肌肉的寄生蟲疾病，人類感染主要是因為食入未完全煮熟的肉，尤其是豬肉或熊肉，是一種重要危害公共衛生的疾病。 |
| 53 | 鉤端螺旋體病可經由食入或接觸受感染動物之尿液或組織污染的水、土壤、食物而感染。 | 0 | 鉤端螺旋體可經由食入或接觸受感染動物之尿液或組織污染的水、土壤、食物而感染。當人們工作（農夫、衛生下水道工程人員或維修人員、礦工）、游泳、戲水或野營時，經由皮膚傷口、口咽黏膜、眼結膜、鼻腔或生殖道的傷口感染。 |
| 54 | 豆豆在書上看到曾造成世界大流行的黑死病-鼠疫的介紹，鼠疫會藉齧齒類動物身上跳蚤（如印度鼠蚤）之叮咬而傳播，造成各種動物及人類的感染。 | 0 | 鼠疫是由鼠疫桿菌所造成的一種人畜共通傳染病，又名黑死病。鼠疫桿菌會藉齧齒類動物身上跳蚤（如印度鼠蚤）之叮咬而傳播，造成各種動物及人類的感染。 |
| 55 | 小吳前往狂犬病流行區域旅遊，途中聽導遊叮嚀：患有狂犬病之動物，其唾液中含有病毒，狂犬病病毒會隨著動物的唾液，透過動物抓、咬的傷口進入人體，所以接觸動物時要特別當心。 | 0 | 狂犬病由狂犬病病毒引起的一種急性病毒性腦脊髓炎，致死率幾達100%。患有狂犬病之動物，其唾液中含有病毒，狂犬病病毒隨著動物的唾液，透過動物抓、咬的傷口進入人體。拉丁美洲常發生吸血蝙蝠傳染至家畜的案例。人類患者的唾液也會有狂犬病病毒，理論上有可能透過人與人直接傳染，但是至今尚無病例報告。但是曾發生病患捐贈眼角膜，導致受贈者感染狂犬病案例。蝙蝠群居的山洞或進行狂犬病病毒培養的實驗室也有可能經由空氣傳染狂犬病，不過非常罕見。 |
| 56 | 安安老師最近傳出懷孕的好消息，她上網查詢懷孕相關訊息時，看到弓形蟲感染症的資料，如果懷孕婦女是懷孕期間第一次感染弓形蟲感染症，會有傳染給胎兒的危險性，不過如果婦女於懷孕前即被感染，就沒有傳染給胎兒的危險。 | 0 | 弓形蟲感染症是由弓形蟲感染所引起的疾病。弓形蟲是一種寄生在細胞內的原蟲。弓形蟲感染症主要是透過食入未經煮熟的牛、羊、豬肉與食或入食入含有具感染力速殖體的動物組織及體液傳染，此外，也可會透過被貓排出的卵囊，污染食物或器械而間接傳染。感染途徑包括經口、皮膚、胎盤、器官移植、輸血、齧齒類及實驗室意外等。懷孕婦女如果是懷孕期間第一次感染，會有傳染給胎兒的危險性，不過如果婦女於懷孕前即被感染，就沒有傳染給胎兒的危險。 |
| 57 | 恙蟲病不會直接由人傳染給人。 | 0 | |
| 58 | 進入雜草區應穿著長袖衣褲、鞋子，身體裸露處塗抹驅蟲劑，回家後立刻洗澡和換洗全部衣服，可減少恙蟲感染機會。 | 0 | |
| 59 | 感染恙蟲病後，可用抗生素藥物治療。 | 0 | |
| 60 | 腸病毒發病後數天才開始有傳染力。 | X | 恢復期的病人仍殘有病原體，所以仍具有傳染力。 |
| 61 | 零零柒運送流感疫苗時，將其保存溫度維持在0°C以下是保護疫苗品質的重要步驟。 | X | 流感疫苗是不活化疫苗，須保存於2-8°C，但不可凍結 |

106年度健康小學堂(是非題)

| 題號 | 題目 | 解答 | 解釋 |
|----|--|----|--|
| 62 | 當小思接種完流感疫苗,小思一定不會罹患流感。 | X | 流感疫苗所包含之病毒株僅包含目前最常流行之3種病毒 型別,加以病毒易突變特性,故於接種流感疫苗後,是有可能感染其他型別的流感;另外,個人接種流感疫苗後產生之保護效果亦有個別差異,故少數人也有可能在保護力不足的情形下感染病毒。 |
| 63 | 百日咳是一種由細菌引起的呼吸道傳染病。 | 0 | 百日咳是感染百日咳桿菌所引起的。 |
| 64 | 依據疾病管制署公告之空氣及飛沫傳染防護措施,戴手套是預防呼吸道病原體經空氣及飛沫傳播的方法。 | X | 呼吸道病原體經空氣及飛沫傳播,空氣及飛沫傳染防護措施是戴口罩。 |
| 65 | 衛生局呼籲大家使用「公筷母匙」,是因為「公筷母匙」可以降低B型肝炎病毒傳播的風險。 | X | B型肝炎透過血液、體液而感染,A、E型肝炎是透過食物與飲水來感染,因此公筷母匙可避免A、E型肝炎的感染。 |
| 66 | 因有流感症狀,醫師開立抗病毒藥物治療,服藥期間,如有出現身體不適的狀況,可以先自行觀察兩天,不須急著就醫。 | X | 在服用抗病毒藥物期間,如有出現身體不適的狀況,應儘速就醫以處理可能發生的副作用。 |
| 67 | 流感是一種常見的急性呼吸道傳染病。主要是由流感病毒感染而致病,病毒毒性強,大致上可分為A、B、C三型。A型常會引起大流行,B型則是區域性流行,而C型則是散發性感染。 | 0 | |
| 68 | 豆魚肉蛋類含豐富的醣類。 | X | 豆魚肉蛋類為蛋白質重要來源 |
| 69 | 流感和一般感冒不同,雖然都是病毒感染,但致病原不同、症狀輕重程度也不同。一般感冒通常只有局部的上呼吸道症狀,且比較不會出現併發症,但流感卻會引起嚴重的全身性症狀,且可能出現併發症,甚至死亡 | 0 | |
| 70 | 流感病毒主要是在密閉空間中,經由空氣傳播(屬飛沫傳染),但其病毒可在環境中存活數小時,所以也可能經由接觸傳染。 | 0 | |
| 71 | 預防流感,最好的方法是施打流感疫苗。 | 0 | |
| 72 | 蚊子怕水,所以在陽臺放幾個裝滿水的容器可以驅逐蚊子。 | X | 蚊子幼蟲在有裝滿水的容器孳生。 |
| 73 | 人傳人的流行性感冒,簡稱為「流感」;由禽鳥傳染給人类的流行性感冒,簡稱為「禽流感」。 | 0 | |
| 74 | 曾感染水痘者,日後不會再發生水痘,但水痘帶狀病毒仍會在體內潛伏,日後可能引起帶狀疱疹。 | 0 | 出過一次水痘後,會產生終生免疫不會再有水痘症狀發生,但病毒也會在體內潛伏,日後可能引起帶狀疱疹。 |
| 75 | 保持室內空氣的流通,並養成肥皂洗手的好習慣,可預防水痘。 | 0 | 水痘主要透過飛沫、接觸等方式傳染。 |

106年度健康小學堂(是非題)

| 題號 | 題目 | 解答 | 解釋 |
|----|---|----|--|
| 76 | 水痘患者傳染力高，應避免至公共場所及搭乘大眾運輸交通工具。 | 0 | |
| 77 | 馬桶上面有很多看不見的細菌，共用馬桶會感染愛滋病。 | X | 愛滋病毒接觸空氣很快就會死亡，共用馬桶洗衣設備不會傳染。 |
| 78 | 禽流感原本是一種禽鳥類之間的流行性感冒，但最近幾年已經有禽鳥類傳染給人的案例發生。 | 0 | |
| 79 | 腸病毒雖然對酸及許多化學藥物具抵抗力，但使用酒精就可以有效殺死腸病毒。 | X | 酒精、乙醚、氯仿及酚類等常見消毒劑對腸病毒殺滅效果不佳。 |
| 80 | 目前感染愛滋病毒可以吃藥完全治癒。 | X | 愛滋病目前只能靠藥物控制病毒量，並無法根除病毒。 |
| 81 | 為了預防傳染病發生，鄰里間應該要互相督促及幫忙清潔住家附近環境，以維持環境清潔。 | 0 | |
| 82 | 非類固醇的消炎止痛藥，大多含有止痛退燒、消炎的效果。 | 0 | 目前臨床常被使用的止痛藥有三大類，包括非類固醇類消炎藥（如diclofenac待克菲那）、乙醯胺酚（如普拿疼）和鴉片類止痛劑。 |
| 83 | 所謂救溺五步，就是叫、叫、伸、拋、划 | 0 | |
| 84 | 健保署無提供服務電話供民眾查詢健保費等相關問題 | X | 健保署有提供服務電話供民眾查詢健保費等相關問題 |
| 85 | 看門診不領藥回家覺得很「吃虧」，所以到不同醫院重複領藥，多的囤積在家中比較安心。 | X | 有些民眾覺得吃了幾次病情沒有改善，就換到另一家醫院看診，短時間內密集就診，領到名稱不同但藥理作用相似的藥品，容易造成重複用藥發生嚴重副作用。 |
| 86 | 平時要好好保管健保IC卡，不要過度彎折卡片。 | 0 | 保存方式：1. 不可過度彎折卡片、刮戳晶片；2. 不要水洗或泡水，也不可以用酒精、溶劑擦拭晶片；3. 避免直接接觸電源、火源、高溫曝曬，或放置在電視、電腦等高磁場的環境內。 |
| 87 | 小天因為長期吸食毒品，小天媽媽不忍兒子被抓去關，所以決定只要居家自我隔離戒毒即可。 | X | 吸毒的人應到醫療機構接受治療，並與輔導人員合作，接受其輔導與協助。目前衛生福利部已指定了一百多家醫療及諮詢機構及輔導團體，可供參考。 |
| 88 | 約會強暴丸的特色通常無色、無臭，但有特殊氣味，所以要加在飲料裡掩蓋味道。 | X | 約會強暴丸的特色：多屬於中樞神經抑制劑，令受害者昏睡；通常無色、無臭、無味；加在飲料裡，不易被察覺。 |
| 89 | 三餐至少要有1/3為未精緻的全穀雜糧食物。 | 0 | |
| 90 | 小恩去看牙醫，牙醫師對他說幼兒時期的牙齒大概20顆，長大後會再多4-5顆牙齒。 | X | 人類乳齒20顆，恆齒28-32顆。 |
| 91 | 學校、餐廳、機場、電影院或是兒童及少年教育或活動為主要目的的場所，皆全面禁菸。 | 0 | |
| 92 | 在室內抽完菸後，二手菸的物質仍會殘留於家具表面。 | 0 | |
| 93 | 吸菸會傷害呼吸道的粘膜，造成咳嗽、咳痰、喉嚨痛、打噴嚏、流鼻水、破壞免疫系統，因此吸菸者普遍較為容易感冒，造成支氣管炎及肺炎。 | 0 | |
| 94 | 出現呼吸道症狀時應戴上口罩，以免傳染給別人。 | 0 | 生病時應隨時戴上口罩，以免傳染給別人。 |

106年度健康小學堂(是非題)

| 題號 | 題目 | 解答 | 解釋 |
|-----|--|----|---|
| 95 | 罹患水痘時，需按時擦藥，並穿著寬鬆、通風透氣的衣物。 | 0 | |
| 96 | 為了讓水痘早點消失，患者可以把水痘一顆顆擠破。 | X | 如果弄破了膿皰，容易造成皮膚的感染，會留下疤痕。這是水痘最常見到併發症。 |
| 97 | 預防B型肝炎，最有效的方法是接受疫苗接種。 | 0 | B型肝炎疫苗可有效預防B型肝炎病毒感染，所以自1987年起，已全面實施幼兒B型肝炎預防接種，小孩凡出生24小時內需接種第1劑B型肝炎疫苗，然後於出生滿1個月及6個月時，再依序接種第2、3劑B型肝炎疫苗。 |
| 98 | 腸病毒感染發病前數天在喉嚨及糞便都有病毒存在，即開始有傳染力，通常以發病後一週內傳染力最強。 | 0 | 腸病毒感染的潛伏期大約2至10天，平均約3到5天，發病前數天在喉嚨及糞便都有病毒存在，即開始有傳染力，通常以發病後一週內傳染力最強；而患者可持續經由腸道釋出病毒，時間可達8到12週之久。 |
| 99 | 結核病只會發生在肺部，所以稱「肺結核」或「肺癆」。 | X | 結核病是由結核桿菌引起的一種傳染病，結核菌侵入人體後可在任何器官引起病變，如肺、腦膜、淋巴腺、骨骼、腸、泌尿及生殖器官等。但因結核菌在繁殖時需要氧氣，所以大多會在肺內，尤其是肺葉上半部繁殖，所以在結核病中肺結核佔九成。 |
| 100 | 未經過醫生許可就私下使用管制藥品行為就是吸毒。 | 0 | 管制藥品如果能夠遵照醫師囑咐使用，是醫療用途，將其濫用才是毒品。 |

本題庫來源：新北市政府衛生局