

113 年度臺中市政府所屬機關及學校護理人員  
暨公立幼兒園契約進用護理人員聯合甄選

緊急救護科

請不要翻到次頁！

讀完本頁的說明，聽從監試委員的指示才開始作答

※請先確認你的答案卡、准考證與座位號碼是否一致無誤。

請閱讀以下測驗作答說明

測驗說明：

113 年度臺中市政府所屬機關及學校護理人員暨公立幼兒園契約進用護理人員聯合甄選，緊急救護科題本，題本採雙面印刷，共 80 題，測驗時間 90 分鐘，作答開始與結束請聽從監試委員的指示。

注意事項：

1. 所有試題均為四選一的選擇題，答錯不倒扣。
2. 依試場規則規定，答案卡上不得書寫姓名及任何標記。故意污損答案卡、損壞試題本，或在答案卡上顯示自己身份者，該科測驗不予計分。

作答方式：

請依照題意從四個選項中選出一個正確或最佳的答案，並用 2B 鉛筆在答案卡上相應的位置劃記，請務必將選項塗黑、塗滿。如果需要修改答案，請使用橡皮擦擦拭乾淨，重新塗黑答案。

請聽到鈴（鐘）聲響後再翻頁作答

試題公告  
僅供參考

選擇題（共 80 題，每題 1.25 分，共 100 分，答錯不倒扣）

1. 遇到一個人倒地不起，給予CAB，壓胸30次後給予人工呼吸，當吹氣後胸部沒有起伏，應考慮？  
(A)再打開一次呼吸道，予以吹第二口氣  
(B)檢查有無異物堵塞  
(C)開始作哈姆立克急救術  
(D)放棄吹氣，開始作心臟按摩
2. 只有單一人時，下列何種情況，應先急救2分鐘再去求救？  
(A)溺水 (B)藥物中毒 (C)創傷病人 (D)以上皆是
3. 在學校運動場上看到一名老師突然倒地，無意識且無呼吸，在下列何種情況下應使用AED？  
(A)受傷但有呼吸 (B)僅有呼吸急促  
(C)意識清醒但無法行走 (D)無呼吸且無反應
4. 托育中心一位1歲孩童，吃午餐後出現咳嗽不止、臉色發紅等症狀，應先立刻進行何項緊急措施？  
(A)讓孩童喝水停止咳嗽 (B)立即打119電話求救等待救援  
(C)施行拍背與戳胸法 (D)立刻進行口對口人工呼吸
5. 你是一名校護，在教導學生戶外如何避免蜂蜇，請問下列教學內容何者不適當？  
(A)避免身上有香味 (B)穿著鮮豔衣服避免走失  
(C)穿著長袖衣褲避免皮膚露出 (D)避免碰觸蜂巢
6. 呈上題，戶外教學當天，突然有一位學生出現皮膚癢，疑似虎頭蜂叮咬，以下哪個症狀可懷疑是過敏性休克？  
(A)高血壓 (B)皮膚潮紅 (C)呼吸困難緊縮感 (D)低血糖
7. 「巴拉刈」是劇毒的除草劑，「巴拉刈」農藥中毒最常破壞哪一個臟器？  
(A)肝臟 (B)脾臟 (C)腎臟 (D)肺臟
8. 針對藥物中毒處置，下列何者正確？  
(A)服藥後60分鐘後進行催吐最有效  
(B)小於6個月的嬰兒使用催吐效果佳  
(C)腐蝕性物質可以利用催吐  
(D)活性碳不會吸附重金屬物質
9. 一位9歲男生，上體育課大量流汗，並出現呼吸急促、肌肉抽筋、意識模糊臉色蒼白，體溫攝氏38.5度，以下何者緊急措施不適當？  
(A)將病患移到陰涼的環境 (B)鬆開衣服散熱  
(C)補充含糖飲料補充熱量 (D)維持呼吸道通暢
10. 針對手指不慎凍傷的學童，提供之護理照護何者適當？  
(A)趕快取火保暖 (B)揉搓凍傷部位 (C)予熱水袋保暖 (D)浸泡溫水

11. 關於腸病毒之敘述，以下何者錯誤？  
(A)發病後一週內傳染力最強，透過口鼻分泌物、糞便及飛沫傳染  
(B)持續昏睡、嘔吐及抽搐  
(C)71型腸病毒致病力較高，但不會出現發燒症狀  
(D)建議使用500ppm濃度漂白水進行一般環境消毒
12. 針對肋骨骨折的病患緊急處置，下列何者錯誤？  
(A)臥床休息  
(B)注意生命徵象變化  
(C)評估呼吸音  
(D)鼓勵深呼吸咳嗽
13. 原發性自發性氣胸好發於年輕男性，下列臨床檢查與評估何者錯誤？  
(A)患側觸診時觸覺震顫增強  
(B)患側叩診出現過度反響音  
(C)患側呼吸音減弱或消失  
(D)橫膈膜離軌度不變
14. 一位學生主訴被動物咬傷大腿，對於急性傷口處理的原則，何者不適當？  
(A)若有出血情形先進行止血動作  
(B)進行清潔傷口減少感染發生  
(C)了解事件當下發生情形  
(D)選擇適當敷料可維持傷口在乾燥的環境中
15. 顱內壓上升IICP是頭部外傷常見的症狀，請問有關IICP敘述，下列何者錯誤？  
(A)意識改變 (B)心跳變慢 (C)呼吸變快 (D)脈壓變寬
16. 一位學生有癲癇病史，長期服用Dilantin藥物，有關癲癇之發作導因，下列何者錯誤？  
(A)熱性痙攣 (B)頭部創傷 (C)高血壓 (D)腦部感染
17. 呈上題，學生於學校癲癇發作之照護及衛教，何者不適當？  
(A)癲癇為急性發作不會有先前預兆，無法預防  
(B)指導學生服用Dilantin藥物需要留意口腔衛生  
(C)評估學生可能出現低自尊等社交問題  
(D)發作時須留意呼吸道通暢
18. 放學時段，學校大門口有一位行走上學的學生被一台機車從身體側面撞擊，身為學校護理師，你可以快速進行神經系統評估的項目不包含下列何者？  
(A)睜眼反應 (B)顱內壓 (C)瞳孔反應 (D)語言反應
19. 呈上題，你評估傷者後，下列症狀敘述和疑似受傷部位配對何者錯誤？  
(A)肚臍周圍有瘀傷可能腹膜內出血  
(B)左下肋瘀傷且有肋骨骨折懷疑肝臟受傷  
(C)左下肋瘀傷且有肋骨骨折懷疑脾臟受傷  
(D)後腰背有瘀傷可能腹膜內出血

20. 呈上題，脊椎受創緊急救護措施，下列何者不適當？
- (A) 評估病患意識及生命徵象
  - (B) 維持呼吸道通暢，懷疑頸椎受傷應採壓額抬下巴法
  - (C) 翻身採圓滾木翻身法
  - (D) 移動病患時須使用長背板固定
21. 上美勞課學生被刀片割傷，以敷料加壓止血5分鐘後，傷口持續滲出許多血液，下列處置何者錯誤？
- (A) 將患肢低於心臟
  - (B) 注意傷患的呼吸、脈搏、膚色情況，以預防休克
  - (C) 持續加壓止血
  - (D) 在原有敷料上再加敷料並加壓
22. 一位學生右大腿因骨折上石膏，他出現下列何種現象時，是可以觀察不需緊急處理？
- (A) 上石膏的右大腿下肢體的脈搏消失
  - (B) 一段時間後，聞到石膏下的右大腿有酸味
  - (C) 右大腿膚色改變及冰冷
  - (D) 上石膏的右大腿劇烈疼痛
23. 若休克病人的治療與照護有效，關於臨床表徵已改善的描述，下列何者錯誤？
- (A) 意識清楚
  - (B) 在沒有使用升壓劑的情況下，收縮壓大於90 mmHg
  - (C) 尿量每小時小於30 mL
  - (D) 呼吸困難改善
24. 處理被毒蛇咬傷病患護理措施之敘述，下列何者正確？
- (A) 咬傷後速用冰敷，減輕紅腫
  - (B) 以酒精消毒咬傷傷口
  - (C) 傷口疼痛可以給予Aspirin類止痛劑
  - (D) 保持咬傷肢體低於心臟
25. 國小四年級學童在盪鞦韆時，突然由鞦韆跌下倒臥在地，身為護理師的你應該如何優先處置？
- (A) 固定頸椎，維持脊椎平直
  - (B) 電話求救，再通暢呼吸道
  - (C) 先吹2口氣，再進行CPR
  - (D) 輕拍學童肩膀，確定有無意識
26. 處置突然意識喪失倒下或心跳驟然停止等突發狀況病人，醫護人員應優先執行下列何種評估？
- (A) CAB評估
  - (B) Glasgow coma scale評估
  - (C) PQRST評估
  - (D) head-to-toe病人評估

27. 同學在做化學實驗時，不慎將強酸潑灑到手臂，下列何者護理措施為最優先？
- (A)將手臂以毛巾包住送急診
  - (B)等待護理人員來救治
  - (C)立即並持續沖冷水
  - (D)患處塗抹凡士林或乳液
28. 對於在急診室對急性闌尾炎病人的照護措施，下列何者錯誤？
- (A)協助採取屈膝臥位
  - (B)腹部採用熱敷，減輕疼痛
  - (C)評估是否有腹部僵硬情形
  - (D)不可使用瀉劑與灌腸
29. 下列對於心臟電擊治療術的描述，何者錯誤？
- (A)針對心室纖維顫動最有效的處理便是電擊
  - (B)放置電擊板前使用酒精或Benzoin清潔皮膚
  - (C)應在電擊板與皮膚之間使用electrode gel
  - (D)心室纖維顫動的初次電擊為120~200焦耳/次
30. 同學騎腳踏車來上課途中，被汽車撞倒，送到醫院急診室就醫。現在左下肢開放性骨折，傷口流血不止，沾滿整條長褲。此時護理人員應優先採取下列何種措施？
- (A)用消毒紗布直接加壓於骨折處傷口
  - (B)將骨折肢體抬高，高於心臟15公分以上
  - (C)迅速剪開病患衣服，辨認出血位置
  - (D)壓迫右足背動脈來止血
31. 有關一氧化碳中毒症狀的描述，下列何者錯誤？
- (A)呼吸有水果味
  - (B)頭暈、視力模糊
  - (C)噁心、嘔吐
  - (D)皮膚及嘴唇呈桃紅色
32. 照護休克病人時，常讓病人平躺後，抬高雙腿30度的主要目的為？
- (A)加速神經傳導
  - (B)增加回心血量
  - (C)促進胸腹呼吸
  - (D)預防下肢水腫
33. 下列何者為造成熱衰竭病人常見有腎小管壞死合併症的主要原因？
- (A)組織代謝率高
  - (B)橫紋肌溶解
  - (C)鉀離子缺乏
  - (D)血小板凝集
34. 當護理師發現一位長者在進食時因為噎到導致滿臉通紅，長者不斷用力捶胸與咳嗽，此時護理師應該如何協助該長者？
- (A)不干擾其咳嗽，繼續觀察咳嗽聲音
  - (B)立刻用手拍打其背部協助咳出
  - (C)讓長者躺下，給予哈姆立克急救法
  - (D)盡速雙臂環抱其腰，進行哈姆立克急救法

35. 災難大量傷患急救原則之敘述，下列何者錯誤？  
(A)迅速抵達災難地點，立即評估傷病嚴重度，勿任意移動或破壞事故現場  
(B)用觀察、接觸、交談方式，迅速正確檢查傷患  
(C)迅速檢查傷患瞳孔、血壓、體溫  
(D)詳細觀察事故現場及導致身體傷害的物體
36. 救護技術員抵達交通幹道意外事故現場，最需立即行動的事，下列何者最正確？  
(A)處理有性命危險的傷患  
(B)評估現場施救安全的情況  
(C)致電指揮中心回報現場情況  
(D)撤離所有在場的傷患
37. 六年級學童外傷事故，經創傷機轉的評估，下列情況可能造成嚴重創傷者為？ ①胸、腹部有鈍傷 ②小客車撞上行走中的學童 ③從2公尺高度墜落 ④摩托車車禍 ⑤意識程度GCS14分 ⑥乘坐的交通工具翻覆  
(A)①②③ (B)④⑤⑥ (C)①③⑤ (D)②④⑥
38. 當病患突然倒地，無頸動脈搏動，呼吸聲沉重且吵雜，約八秒口張開又閉合，胸部沒有正常起伏，最優先的急救措施，下列何者正確？  
(A)體外心臟按壓  
(B)使用甦醒球輔助呼吸  
(C)給予口腔抽痰  
(D)給簡單氧氣面罩
39. 對於心律不整造成猝死，需施行電擊去顫術，下列何者正確？ ①心室顫動(Ventricular Fibrillation, VF) ②無脈搏電氣活動(Pulseless Electrical Activity, PEA) ③無收縮心律(asystole) ④心室頻脈(Ventricular Tachycardia, VT)  
(A)①② (B)③④ (C)②③ (D)①④
40. 對於5年級學童體重約54公斤，施行高品質的心肺復甦術，下列敘述何者最適宜？ ①壓胸深度5-6公分 ②電擊後立即人工呼吸再壓胸 ③壓胸速率100-120次/分 ④二人CPR每2循環需換手 ⑤壓胸時須讓胸廓回彈後再按壓 ⑥儘量減少壓胸中斷時間  
(A)①②③④ (B)②③④⑤ (C)①③⑤⑥ (D)③④⑤⑥
41. 對4歲幼兒施行單人心肺復甦術胸外按壓，下列敘述何者正確？  
(A)以單手之掌面在胸骨下半段按壓  
(B)壓胸深度為3公分或至少為胸部前後徑的1/2  
(C)壓胸速率應每分鐘100~120次  
(D)壓胸與人工呼吸比率為15：2
42. 依緊急救護法第34條規定，救護人員施行救護，應填具救護紀錄表，而救護記錄應保存年限為？  
(A)至少五年 (B)至少七年 (C)至少九年 (D)10年以上
43. 對於院外的急救原則中對出血傷病患，提供保暖措施的目的，下列何者正確？ ①預防休克發生 ②減少體溫喪失 ③增加週邊細胞利用氧氣 ④減少出血 ⑤減輕疼痛。  
(A)①②③ (B)②③④ (C)③④⑤ (D)①④⑤

44. 小學5年級學童，體重48公斤，家長以機車載上學，在轉彎處摔車，學童左側身體壓在機車下左側大腿變形且血流不止，經119救護技術員給予加壓止血、骨折固定後送到急診，體溫36.2°C、心跳138次/分、呼吸34次/分、血壓106/68mmHg，皮膚溼冷，微血管充填時間>2秒，請依據上述情況回答以下二題。依據上述資料，學童呈現的休克種類，下列何者正確？  
(A)低血容積性休克 (B)心因性休克 (C)神經性休克 (D)血管性休克
45. 承上題，對於學童休克階段的生理變化敘述，下列何者最正確？  
(A)休克早期，尿輸出量及抗利尿激素(ADH)在正常範圍  
(B)代償期，腎素(renin)及抗利尿激素(ADH)上升，尿輸出量下降  
(C)進行期，有代謝性酸中毒及低血糖症狀，尿輸出量下降  
(D)不可恢復期，有呼吸性酸中毒、嚴重低血壓、也可能出現無尿
46. 有關嚴重創傷正在大量出血的傷患，已經造成休克的臨床表徵，下列護理措施何者正確？  
①注意呼吸道通暢給予氧氣 ②對於正在出血的傷口給予直接加壓止血 ③立即打上20號針並輸注濃縮紅血球 ④準備低溫的林格氏乳酸溶液進行靜脈輸注  
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④
47. 上肢受傷以三角巾做為懸臂吊帶時患側之姿勢，下列何者正確？ ①手肘關節彎曲小於90度 ②手肘關節高於手腕關節 ③手心朝下 ④手腕與手掌自然垂放 ⑤手腕與前臂呈同一直線  
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③⑤ (D)②④⑤
48. 左手肘關節以彈性繃帶包紮後，檢查包紮鬆緊適當的正常肢體循環，下列何者正確？  
①左手指甲床蒼白試驗在4秒恢復 ②左右腕關節的深腱反射(deep tendon reflex)結果為++  
③左右手橈動脈脈搏強度為++ ④左右手指無感覺異常(Paresthesia)。  
(A)①② (B)③④ (C)②③ (D)①④
49. 關節脫臼採取的緊急措施，下列何者正確？  
(A)檢查患部是否有捻髮音 (B)將脫臼關節推回原位  
(C)立即送醫 (D)用三角巾固定患部
50. 在大量傷患或災難現場第一位抵達的醫療人員，首要的任務，下列敘述何者正確？  
(A)立刻開始檢傷分類  
(B)撤離處於危險之傷患  
(C)教導傷患為自己作處置  
(D)開始挽救傷患之生命
51. 使用START系統進行災難傷病患的檢傷時，建議花了一個傷病患的檢傷時間，下列何者正確？  
(A)30秒 (B)1分鐘 (C)2分鐘 (D)3分鐘
52. 協助傷病患搬運為保護自己不致受傷，應採取身體力學動作，下列何者最適宜？ ①使用舉起少作推、拉動作 ②盡量以彎曲髖、膝代替腰部彎曲 ③盡量雙腳併攏，以維持重心線之平直 ④移動傷病患時，應盡量靠近重心。  
(A)①② (B)③④ (C)①③ (D)②④

53. 有關毒蛇咬傷右手背的緊急措施，下列敘述何者正確？ ①以消毒的刀在咬傷處十字劃開擠出毒液 ②咬傷後立即以手機拍照，以確認蛇的種類 ③去除右手之手錶、手環和戒指 ④右手背冰敷減少疼痛，儘速送醫  
(A)①③ (B)②④ (C)②③ (D)①④
54. 對於食物中毒之敘述，下列何者正確？  
(A)沙門氏桿菌(Salmonella)中毒症狀主要是腹瀉、噁心、嘔吐及發燒  
(B)金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)中毒症狀主要是視力模糊、吞嚥困難  
(C)河豚中毒主要是處理河豚過程被細菌汙染造成  
(D)腸炎弧菌(Vibrio parahaemolyticus)常見於受污染的畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品
55. 運動會1公里賽跑六年級選手，呈現臉色蒼白皮膚濕冷，意識清醒，運動服因大量出汗而滴水，呼吸32次/分，脈搏快而弱，體溫39.4°C，以下處置何者正確？ ①抬高頭部45-60度角 ②移至陰涼處以冰冷濕毛巾敷在頭、頸部 ③應限水，避免腎臟衰竭 ④運動服更換為乾的寬鬆衣服。  
(A)①② (B)③④ (C)①③ (D)②④
56. 夏天在露天籃球場上，國中二年級學生突然不明原因昏倒，臉色潮紅，皮膚乾熱，呼吸28次/分，脈搏強而快，體溫41.6°C，下列最可能情況為？  
(A)熱性痙攣(Heat cramp) (B)熱中暑(Heat stroke)  
(C)熱暈厥(Heat syncope) (D)熱衰竭(Heat exhaustion)
57. 3年級學童有癲癇病史，上課時突然全身抽搐，意識不清，牙關緊閉，口吐白沫，下列緊急措施何者正確？ ①移開學童身邊桌椅，以防撞傷 ②當意識不清抽搐停止應採平躺，等119到來 ③應在口中放置壓舌板以防止學童咬傷舌頭 ④鬆開頸部衣物鈕釦、腰部皮帶  
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④
58. 有關燒燙的傷患緊急處理措施，下列敘述何者錯誤？  
(A)以流動無壓力的冷水沖患部以降溫  
(B)移除患部的衣物時，若衣物與傷口粘連勿強行脫除  
(C)若有水泡應該小心戳破以加速傷口癒合  
(D)大面積或臉、手等部位燙傷應儘快就醫
59. 心肌梗塞發作大多數病患的疼痛性質，下列敘述何者最適宜？  
(A)位於胸骨下，有壓迫或擠壓的感覺  
(B)如刀割般尖銳，吸氣時會加劇  
(C)悶脹痛，位於上腹，常被誤認為消化不良  
(D)撕裂痛，位於背後兩肩胛骨間
60. 您在學校教職人員上一堂有關缺血性腦中風預防及緊急處置的課程，下列指導何者錯誤？  
(A)大多數腦中風病人的血壓，會在疼痛、躁動、腦壓受控制後自然降低  
(B)緊急降血壓可能會導致腦部血液灌流不足  
(C)若適合給血栓溶解劑，會在腦中風發作後6-8小時給藥  
(D)控制不佳的高血壓或糖尿病為給血栓溶解劑之禁忌症

61. 有關一氧化碳中毒，下列敘述何者錯誤？
- (A) 一氧化碳中毒常有頭暈、頭痛、噁心、嘔吐等症狀
  - (B) 一氧化碳對血液中血紅素的結合力，為氧氣的100倍
  - (C) 治療為給予高濃度氧氣
  - (D) 已有神經學症狀者則需要高壓氧治療
62. 有關毒蛇咬傷的到院前處置原則，下列敘述何者錯誤？
- (A) 沒有看到明顯的毒舌牙痕，也不能排除毒蛇咬傷的可能性
  - (B) 用清水或生理食鹽水清洗咬傷傷口，以防毒素持續被吸收
  - (C) 毒蛇咬傷傷口可先給予冰敷，以降低毒素的循環及吸收
  - (D) 咬傷患肢需放低(低於心臟)，傷口不擠壓、不切開
63. 有關腹部創傷的處置，下列敘述何者錯誤？
- (A) 不應該嘗試將外露的臟器推回腹腔內
  - (B) 露出的腹部臟器應以生理食鹽水無菌敷料覆蓋
  - (C) 腹部有穿刺物時，應小心移除
  - (D) 腹部臟器外露的患者不應咳嗽及腹部用力
64. 有關肢體創傷的評估，下列敘述何者錯誤？
- (A) 要除去循環阻礙，如戒指、手環
  - (B) 腔室症候群與動脈受傷的表現很像
  - (C) 6P症狀包括paresthesia、poikilocytosis
  - (D) 肢體的評估應包括骨骼、軟組織、神經、血管
65. 根據BLS的通用流程，一位男性突發性倒地，使用AED分析心律，AED指示要電擊，在給過1次電擊之後，病人沒有反應。下一步應如何處置？
- (A) 檢查脈搏，讓AED再分析一次心律
  - (B) 立刻給予5個30：2循環之CPR，然後再電擊
  - (C) 立刻給予5個30：2循環之CPR，兩分鐘後再分析心律
  - (D) 移除 AED，然後立刻給予持續之CPR，直到救護人員到達
66. 有關AED之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 有體內自動心臟去顫器者不可使用AED電擊
  - (B) 電極貼片應依圖示貼在右鎖骨下及左心尖處
  - (C) 皮膚若有潮濕要先擦乾再貼電極貼片
  - (D) 機器分析心律時，行進中的救護車應先停靠路旁
67. 有關基本救命術，下列敘述何者錯誤？
- (A) 評估意識後，應在10秒內完成呼吸及心跳的評估
  - (B) 給予正確的心外按摩，則可產生正常人之1/4-1/3之心搏出量
  - (C) 若病患小於8歲或溺水者，可先給予急救2分鐘後再求救
  - (D) 能自行呼吸但意識不清的孕婦，應轉成右側臥之復甦姿勢

68. 在院外遇到無血壓計可測量血壓情況下，藉由觸診橈動脈可測得脈搏時，代表收縮壓至少為多少mmHg？  
(A)90 (B)80 (C)70 (D)60
69. 有關自動體外電擊去顫器(AED)的敘述，下列何者錯誤？  
(A)使用時機為病人出現心室纖維顫動或是無脈搏心室心搏過速  
(B)所謂早期電擊是指病人倒地後5分鐘內給予電擊  
(C)AED有整流與去顫電擊兩種功能  
(D)電擊完立即給予心臟按壓
70. 有關蜂螫及其措施之敘述，下列敘述何者錯誤？  
(A)遭受10個以上位置蜂螫者，容易發生毒性反應  
(B)避免身上有香味可預防蜂螫  
(C)蜂毒性微鹼，故用氨水或小蘇打水塗抹螫傷處  
(D)傷口可用冰敷及抗過敏藥膏以緩解腫痛
71. 關於皮膚燒傷的三度四分法則，下列敘述何者錯誤？  
(A)一度燒傷，不治療約一周可自行痊癒  
(B)淺二度燒傷，可能會留下輕微疤痕，約10-14天癒合  
(C)深二度燒傷，會留下明顯疤痕，約14-20天癒合  
(D)三度燒傷，常無法自行癒合，須施以植皮治療
72. 一位18歲男性，雙大腿前側和雙小腿前側及會陰部二度燒燙傷，表皮紅腫潮濕、多處起水泡與破皮，該病人燒燙傷面積和嚴重度為何？  
(A)燒燙傷面積37%，屬於中度燒燙傷  
(B)燒燙傷面積19%，屬於中度燒燙傷  
(C)燒燙傷面積37%，屬於重度燒燙傷  
(D)燒燙傷面積19%，屬於重度燒燙傷
73. 有關電擊傷之敘述，下列何者錯誤？  
(A)盡快使用乾燥及不導電工具幫助病患遠離觸電電源  
(B)若為多人被電擊，最先要搶救的是意識清楚者  
(C)會出現血尿、肌球蛋白尿(紅黑色尿液)  
(D)電流入口處傷口可能呈燒焦狀或被隱藏於體內
74. 同學在廁所發現一位意識不清學生，身旁有一個用過的針筒，緊急求助健康中心。下列評估敘述，何者不適當？  
(A)檢查病人的手肘或者腹股溝處有無注射的針孔  
(B)患者心跳、呼吸和血壓正常，仍需送醫  
(C)有瞳孔放大、意識混亂，要懷疑可能海洛因中毒  
(D)若懷疑是鴉片類藥物中毒，可能會有呼吸緩慢
75. 有關法定傳染病通報時間的敘述，下列何者有誤？  
(A)腸病毒感染併發重症需在24小時內通報  
(B)新型A型流感需在24小時內通報  
(C)恙蟲病需在1週內通報  
(D)日本腦炎需在1週內通報

76. 小新受到胸部外傷，經救護車在事故10分鐘後送來急診室，理學檢查發現小新意識清楚、呼吸淺快、頸靜脈怒張，不會因深呼吸而塌陷，兩側均有清楚呼吸音，護理師告知血壓只有82/63mmHg，脈搏為152次/分，下列診斷何者最正確？  
(A)心包膜填塞 (B)張力性氣胸 (C)早期低血容積休克 (D)神經性休克
77. 5歲的小亮喉嚨痛、全身紅疹，體溫曾高達39.3°C，目前已發燒兩天且症狀無改善入急診求治，體溫38.8°C，WBC 15000/ $\mu$ L，身體評估發現舌頭鮮紅如草莓、扁桃腺紅腫有滲出液，經醫師診斷為猩紅熱後開藥返家照顧，關於此疾病之敘述，下列何者正確？  
(A)喉頭培養將檢測出肺炎黴漿菌 (*Mycoplasma pneumoniae*)  
(B)紅疹首先出現於臉部、四肢，24小時後遍佈全身  
(C)傳染途徑為飛沫或直接接觸傳染  
(D)為第三類法定傳染病，應於一週內完成通報
78. 兩歲的鈴鈴失足跌落池塘中，經過四分鐘被救起送醫，診斷為溺水，目前體溫為28°C，關於回復體溫之處置，下列何者最適當？  
(A)給予一般急救藥物和去顫術  
(B)36-38°C的加熱靜脈輸液  
(C)給予溫熱的毯子覆蓋四肢  
(D)40-45°C加熱潮濕的氧氣
79. 三歲的小雅不小心吞入花生米而造成呼吸道阻塞，當以哈姆立克法進行急救處置時，以下何者最適當？  
(A)以手掌在小雅背後肩胛骨間叩擊四下  
(B)跪在仰臥的小雅足部，以手掌置於下腹部，用力往上施壓  
(C)站在小雅後面，將拳頭拇指側向劍突下部位，快速向上施壓  
(D)當小雅恢復有效呼吸後的復甦擺位姿勢為正躺且頭部抬高
80. 孩童氣喘發作時的病理機轉為：①支氣管平滑肌鬆弛 ②支氣管內側黏膜水腫 ③分泌黏液增加 ④支氣管痙攣 ⑤肺泡收縮，上述何者正確？  
(A)①②③ (B)②③④ (C)③④⑤ (D)①②⑤

113 年度臺中市政府所屬機關及學校護理人員  
暨公立幼兒園契約進用護理人員聯合甄選

科目：緊急救護科

選擇題（共 80 題，每題 1.25 分，共 100 分，答錯不倒扣）

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A	D	D	C	B	C	D	D	C	D
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
C	D	A	D	C	C	A	B	B	B
21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
A	B	C	D	D	A	C	B	B	C
31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
A	B	B	A	C	B	D	A	D	C
41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
C	B	A	A	B	A	D	B	D	B
51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.
B	D	C	A	D	B	D	C	A	C
61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.
B	C	C	C	C	A	D	B	C	C
71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.
C	D	B	C	A	A	C	D	C	B