

114 年度臺中市政府所屬機關及學校護理人員  
暨公立幼兒園契約進用護理人員聯合甄選

綜合護理學科

請不要翻到次頁！

讀完本頁的說明，聽從監試委員的指示才開始作答

※請先確認你的答案卡、准考證與座位號碼是否一致無誤。

請閱讀以下測驗作答說明

測驗說明：

114 年度臺中市政府所屬機關及學校護理人員暨公立幼兒園契約進用護理人員聯合甄選，綜合護理學科題本，題本採雙面印刷，共 80 題，測驗時間 90 分鐘，作答開始與結束請聽從監試委員的指示。

注意事項：

1. 所有試題均為四選一的選擇題，答錯不倒扣。
2. 依試場規則規定，答案卡上不得書寫姓名及任何標記。故意污損答案卡、損壞試題本，或在答案卡上顯示自己身份者，該科測驗不予計分。

作答方式：

請依照題意從四個選項中選出一個正確或最佳的答案，並用 2B 鉛筆在答案卡上相應的位置劃記，請務必將選項塗黑、塗滿。如果需要修改答案，請使用橡皮擦擦拭乾淨，重新塗黑答案。

請聽到鈴（鐘）聲響後再翻頁作答

試題公告

僅供參考

選擇題（共 80 題，每題 1.25 分，共 100 分，答錯不倒扣）

1. 幫個案進行意識評估，叫喚他才會睜眼；人、地定向感清楚，但時間混淆；能遵照指示正確舉起右手，請問其Glasgow Coma Scale (GCS)昏迷量表，何者正確？  
(A) E3V3M5 (B) E3V4M6 (C) E4V4M5 (D) E4V5M6
2. 癲癇病人的衛教重點，何者正確？①按時服藥並且定期追蹤血中藥物濃度 ②可以依據症狀自行調整藥物 ③癲癇發作時將湯匙置於牙齒之間以免咬傷舌頭 ④服用Dilantin時須維持口腔清潔  
(A)①④ (B)②③ (C)①③ (D)②④
3. 出血性腦中風病人，目前血壓為180/100mmHg，可以使用的藥物治療，下列何者正確？  
(A) Warfarin (B) Aspirin (C) Heparin (D) Trandate
4. 王先生因慢性阻塞性肺部疾病(COPD)入院，現有呼吸困難，請問以下何項護理措施不恰當？  
(A)協助病人採端坐呼吸，改善呼吸困難  
(B)必要時給予病人胸部物理治療，協助將痰液排出  
(C)立即給予50%濃度的O<sub>2</sub>mask給氧氣，以防止缺氧  
(D)教導病人使用橫膈呼吸以改善低血氧狀況
5. 一氧化碳中毒病人的敘述，下列何者錯誤？  
(A)皮膚可能出現粉紅色或桃紅色  
(B)可能會出現肌肉無力、眩暈、頭痛的表徵  
(C)可以給予高壓氧治療  
(D)一氧化碳與血紅素的結合是氧氣的20-30倍
6. 有關全髖關節置換術（total hip replacement；THR）的術後及居家衛教何者正確？①鼓勵患肢作等長收縮運動 ②髖關節屈曲不可超過90度 ③活動時可以使用輔具以減少患肢負重 ④坐時應將患肢交叉跨於健側膝上  
(A)①②③ (B)①②④  
(C)②③④ (D)①③④
7. 王先生因車禍導致頭部外傷被送至急診，現有呼吸困難及發紺，動脈血液氣體分析結果為pH值7.25、PaCO<sub>2</sub> 55 mmHg、PaO<sub>2</sub> 80 mmHg、HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> 22 mEq/L，請問王先生應是下列何種狀況？  
(A)無代償性代謝性酸中毒 (B)無代償性呼吸性酸中毒  
(C)部分代償性代謝性酸中毒 (D)部分代償性呼吸性酸中毒
8. 有關上石膏病人的護理措施何者正確？①須觀察石膏肢體遠端顏色、溫度、活動及感覺 ②石膏外表若有髒污可用清水清洗 ③石膏內皮膚癢可用硬物深入抓癢 ④抬高石膏肢體以促進血液回流  
(A)①② (B)①④  
(C)②③ (D)③④

9. 有關乳癌的敘述，下列何者錯誤？  
(A)好發年齡為45-69歲  
(B)好發乳房的外上1/4  
(C)會出現疼痛性的乳房腫塊或橘皮變化  
(D)乳房切除後患側手臂易淋巴水腫故禁止患側手臂量血壓
10. 下列四位擬接受心瓣膜置換術的個案中，何者最適合接受機械性人工心瓣膜置換術？  
(A)45歲女性，有出血性胃潰瘍病史者  
(B)30歲女性，罹患風濕性心瓣膜病變，預計未來兩年內懷孕  
(C)50歲已停經女性，無出血病史，可以接受定期INR監測  
(D)80歲女性，有高血壓與腎功能下降，合併輕度記憶障礙
11. 陳先生因肝硬化合併腹水住院治療，關於陳先生的護理措施，下列何者正確？①依醫囑給予適當的水分限制 ②每天測量體重與腹圍，記錄輸出入量 ③長期使用Furosemide時要監測高血鈉症的發生 ④協助病人採床頭抬高80度之臥姿  
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
12. 鍾先生因腰椎椎間盤突出接受手術治療，有關手術治療的敘述，下列敘述何者正確？①使用中硬度的床墊，維持脊椎正常排列 ②術後傷口癒合後，可進行威廉氏運動加強下背部的肌肉力 ③應每兩小時將背架取下讓背部休息 ④術後二週傷口癒合後即可恢復原來的活動型態  
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
13. 有關頭部外傷病人顱內壓升高的照護，下列何者正確？①急性期可裝置顱內壓監測器，依醫囑引流腦脊髓液降低顱內壓 ②可以使用Dilantin預防受傷後抽搐的發生 ③若病人有鼻漏時應請病人將鼻水擤乾淨 ④嚴重的顱內壓升高的病人可以使用巴比妥酸鹽(Barbiturate)讓病人鎮靜 ⑤Mannitol治療顱內壓升高應緩慢靜脈注射給與  
(A)①②③ (B)①②④ (C)③④⑤ (D)①②⑤
14. 評估膝關節內是否有少量液體積存之方法，下列何者正確？  
(A)膨脹徵象(Bulge Sign) (B)湯瑪斯試驗(Thomas test)  
(C)麥默雷氏試驗(McMurray's test) (D)拉克曼檢查(Lachman Test)
15. 有關放置胸管(chest tube)病人的敘述，下列何者正確？  
(A)協助醫師拔除胸管時，應指導病人緩慢吸吐氣  
(B)平時應間歇性的夾住管路，避免過度引流  
(C)水封瓶內出現大量氣泡，為正常現象，代表引流系統功能完好  
(D)負壓引流時，抽吸控制瓶應使用持續性抽吸
16. 張先生因直腸癌入院手術，醫師採用腹部會陰切除術及結腸造口術，術後教導結腸造口術後自我照顧之護理指導，下列何者正確？  
(A)結腸灌洗液採用2%肥皂水效果佳  
(B)每次更換造口用具皆須觀察造口周圍皮膚  
(C)結腸造口需以無菌技術更換用具  
(D)需要定時到醫院更換結腸造口袋

17. 林先生，30歲，因發燒、急性後背腰痛到急診，發現輸尿管結石0.5cm，有關尿路結石之護理措施，下列何者正確？①避免食用酸灰性食物如肉類、蛋、乾梅、李子等 ②輸尿管結石引發之疼痛屬突發性、尖銳的疼痛，應依醫囑使用止痛劑緩解疼痛 ③可依醫囑使用平滑肌解痙劑緩解輸尿管痙攣 ④鼓勵多飲用開水、茶或啤酒等，增加尿量  
(A)①② (B)②③ (C)①④ (D)③④
18. 於呼吸音之臨床評估，下列敘述何者正確？  
(A)支氣管阻塞會使呼吸音減弱  
(B)慢性阻塞性肺疾病（COPD）患者呼吸音增強  
(C)氣喘病人常出現爆裂音（crackles）  
(D)肺擴張不全時，患側呼吸音會變大
19. 關於中風導致偏癱病人的體位擺位，下列何項護理措施不適當？  
(A)為預防髖關節外旋，可將粗隆捲軸置於髌骨嵴與大腿中段之間  
(B)為預防肩關節內收，可於上臂與胸壁間腋下墊枕  
(C)膝下放置枕頭，以壓迫膝關節動脈與神經，促進下肢循環  
(D)避免長時間高坐臥姿勢，以防髖關節屈曲畸形
20. 王先生因胃潰瘍出血施行胃部Billroth II手術，於術後第五天排氣進食，王先生抱怨進食後感到腹脹、頭暈、心悸等現象，下列敘述及相關的護理措施何者錯誤？  
(A) Billroth II是將剩餘的胃與空腸吻合  
(B)上述症狀稱為傾倒症候群  
(C)進食後臥床休息  
(D)多攝取低脂、高醣流質飲食
21. 王先生，72歲，罹患慢性阻塞性肺疾病(COPD)，目前因活動後呼吸喘、低血氧入院。根據COPD的敘述，下列何者正確？  
(A)COPD的嚴重度分級評斷標準是根據肺活量(VC)降低程度  
(B)王先生因低血氧應給予氧氣流量3-5L/min  
(C)COPD肺功能測試可發現肺餘容積(RV)增加  
(D)COPD肺功能測試可發現增加第一秒用力呼氣容積(FEV1)增加
22. 有關糖尿病的診斷標準，下列何者正確？①出現多喝、多尿與不預期的體重減輕症狀，且隨機血糖值超過200mg/dl ②葡萄糖耐量試驗1小時後血糖值超過200mg/dl ③禁食超過8小時以上，血糖值超過126mg/dl ④糖化血色素(HbA1c)大於等於7%  
(A)②③ (B)①④ (C)①③ (D)②④
23. 依據”九法則”來計算成人燒傷範圍大小，若病人之後背軀幹全部及雙下肢背面燒傷，則其範圍佔全體表面積之百分比為何？  
(A) 9% (B) 18% (C) 24% (D) 36%
24. 有關腎病症候群(Nephrotic Syndrome)臨床表徵，下列何者正確？①腹瀉 ②蛋白尿 ③頻尿 ④低白蛋白血症 ⑤高血糖 ⑥全身性水腫 ⑦高血鈣 ⑧高脂血症  
(A)①③⑤⑦ (B)②③⑤⑥ (C)②④⑥⑧ (D)①④⑦⑧

25. 吳先生進行肺部手術後，出現持續咳嗽有痰，痰液呈現粉紅色泡沫狀，吳先生主訴呼吸困難，護理人員評估後發現吳先生呼吸速率過快，聽診肺部其呼吸音呈現囉音，下列何者是最可能的合併症？  
(A)肋膜積水 (B)肺炎 (C)肺栓塞 (D)急性肺水腫
26. 蘇先生因結腸直腸癌行手術，並建立迴腸造瘻口，請問下列的護理指導何者正確？  
(A)應多吃蛋、豆類等食物以補充足夠營養  
(B)手術後三週內建議採低渣飲食，三週後飲食可隨個人喜愛變更  
(C)建議病人多攝取高纖飲食  
(D)避免攝取過多水分，每天建議不超過1500ml的液體
27. 陳先生行冠狀動脈繞道手術，為維持陳先生正常的心輸出量，請問下列醫療處置何者錯誤？  
(A)使用Nitroglycerine，可以增加心肌收縮力  
(B)使用Dobutamine，可以增加心肌收縮力  
(C)使用Furosemide(Lasix)，可以降低心臟之前負荷  
(D)使用Nipride，可以同時降低心臟的前、後負荷
28. 一位車禍導致股骨骨折的年輕男性，在接受手術固定後第二天，突然出現躁動不安、呼吸困難、胸前瘀點，且血氧濃度下降等狀況，下列何者為最可能的合併症？  
(A)肺栓塞 (B)氣胸  
(C)脂肪栓塞症候群 (D)橫紋肌溶解症
29. 有關慢性胰臟炎的典型徵象，下列何者錯誤？  
(A)血糖上升 (B)出現透納氏徵象(Turner's sign)  
(C)腹痛 (D)脂肪痢
30. 病人吐出大量暗紅色咖啡渣樣物並主訴頭暈、血壓88/50mmHg、心跳120次/分，護理師應優先採取下列哪一項措施？  
(A)立即給予口服補液以補充血容量 (B)準備高熱量飲食以防低血糖  
(C)協助抬高下肢並啟動輸液準備 (D)協助側臥並立即給口服止吐劑
31. 一名學生參加球賽後右小腿發生開放性骨折，現場可見骨折端外露且持續出血，意識清楚但臉色蒼白、流汗。現場護理師應最優先執行下列哪一項處置？  
(A)立即給水防止休克 (B)嘗試將骨頭推回以利包紮  
(C)穩定骨折端並加壓止血 (D)先搬移患者至保健室內再固定
32. 一位接受甲狀腺部分切除術後2小時病人返病房後抱怨聲音沙啞、吞嚥困難，護理師發現頸部腫脹並觸感緊繃。護理師應最優先考慮下列何種可能？  
(A)麻醉藥物殘效 (B)喉返神經暫時性水腫  
(C)出血導致血腫壓迫氣管 (D)過度疲勞導致說話困難
33. 以內格萊氏法則進行預產期的推算，一位婦女最後一次月經(Last menstrual period; LMP)的第一天是2025年3月10日，請問其預產期應該為何？  
(A) 2025年11月15日 (B) 2025年12月17日 (C) 2026年1月15日 (D) 2026年1月17日

34. 請問國民健康署建議在妊娠16-18週施行羊膜穿刺的原因，何者錯誤？  
(A)才能知道胎兒性別 (B)羊水量足夠  
(C)子宮已上升至恥骨聯合之上易操作 (D)羊水中存活細胞比率最大易培養
35. 第三妊娠期孕婦有背痛的主訴，請問應提供以下何種建議？  
(A)坐姿要挺直背脊，身體重量集中在坐骨 (B)身體後傾30度，身體重量集中在尾骨  
(C)身體前傾30度，身體重量集中在大腿 (D)只坐椅面的前1/3，身體重量集中在恥骨
36. 請問產婦生產完後，焦點集中在自己身上，特別關注自己的睡眠和飲食需求，請問以下敘述何者正確？  
(A)為接受期，護理人員宜傾聽其生產經驗及協助身體與情緒的需求  
(B)為接受期，護理人員宜教導產婦新生兒照顧技巧  
(C)為執行期，護理人員宜傾聽其生產經驗及協助身體與情緒的需求  
(D)為執行期，護理人員宜教導產婦新生兒照顧技巧
37. 請問以下何者不是母嬰親善十大政策？  
(A)幫助產婦產後儘早開始哺餵母乳 (B)實施親子同室  
(C)不提供嬰兒安撫奶嘴 (D)鼓勵準爸爸陪產
38. 施小姐因醫療需要使用催產素引產，以每小時12c.c.靜脈注射。在待產過程中，胎兒監視器顯示間歇性減速。對於施小姐的情況，下列哪一個處置是最優先的？  
(A)繼續維持目前的催產素劑量 (B)立即停止催產素  
(C)調整體位，並給予施小姐氧氣 (D)觀察胎兒反應，不立即採取行動
39. 張女士G1P0，懷孕35週，下列哪些為懷孕期危險徵兆，應建議張女士立即就醫？①胎動減少 ②背痛 ③宮縮頻繁休息未改善 ④下肢水腫 ⑤水狀液體自陰道流出 ⑥小腿靜脈曲張  
(A)①②③ (B)①③⑤ (C)④⑤⑥ (D)②④⑥
40. 李小姐G1P0懷孕30週，因自覺子宮收縮較往常頻繁求診，下列關於早產敘述何者正確？  
①早產是指妊娠未滿35週出生，出生體重低於2500公克 ②若李小姐子宮頸長度短於2.5公分、胎兒黏連蛋白(fFN)陽性反應，則不需積極處理 ③衛教李小姐早產新生兒有可能會有呼吸窘迫症候群 ④若早產兒出生前，孕婦施打皮質類固醇，可以促進胎兒肺部成熟  
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)③④
41. 產後第4天的產婦訴說乳房脹痛且觸痛，體溫38.5°C，乳房局部發紅且硬塊明顯，護理師應優先考慮下列哪項問題？  
(A)泌乳過多 (B)乳腺炎 (C)導管阻塞 (D)正常生理現象
42. 下列有關更年期婦女常見生理變化的敘述，何者正確？  
(A)骨質密度上升，較少骨折風險  
(B)雌激素分泌增加導致經期延長  
(C)心血管疾病風險上升  
(D)體內高密度脂蛋白(HDL)增加，低密度脂蛋白(LDL)減少

43. 護理人員為30歲女性進行子宮頸抹片檢查前指導，何者為正確的準備原則？
- (A)檢查前48小時內可性交但不可沖洗陰道
  - (B)月經期間最適合進行檢查
  - (C)檢查前24小時內避免性交、陰道用藥或沖洗
  - (D)只要無症狀就不需定期抹片檢查
44. 有關妊娠期的營養評估與指導，下列何者錯誤？
- (A)在蛋白質的攝取方面，建議妊娠期的蛋白質攝取應較哺乳期為多
  - (B)妊娠期體重過重可能誘發妊娠高血壓及糖尿病
  - (C)第一期妊娠每日熱量可不需特別增加
  - (D)妊娠期需補充鐵劑時，建議最好空腹服用吸收最好
45. 陳女士懷孕33週，今晨上廁所時，突然發現自己陰道出血，顏色鮮紅但並沒有腹痛現象，陳女士可能的問題是？
- (A)胎盤早期剝離
  - (B)脅迫性流產
  - (C)子宮頸閉鎖不全
  - (D)前置胎盤
46. 有關妊娠糖尿病的敘述，下列何者錯誤？
- (A)宜控制糖化血色素在7.5%以下
  - (B)採飲食控制加上運動，若血糖控制仍不佳，則須配合胰島素使用
  - (C)易發生胎兒畸形或巨嬰
  - (D)孕期高血糖常導致酮酸血症
47. 下列有關骨盆腔發炎性疾病（PID）之敘述，何者錯誤？
- (A)PID多由性接觸傳染病原所致，可經由陰道、子宮頸向上擴散
  - (B)PID常併發輸卵管沾黏，可能導致異位妊娠
  - (C)PID確診主要依症狀與超音波檢查即可，通常無需腹腔鏡檢
  - (D)PID若形成骨盆腔膿瘍，可能須配合抗生素與引流
48. 關於人類乳突病毒（HPV）感染與婦科腫瘤之關聯，下列敘述何者錯誤？
- (A)HPV高危險型與子宮頸癌及癌前病變有高度關聯
  - (B)HPV也與部分外陰癌及陰道癌發生有關
  - (C)HPV與卵巢癌及子宮內膜癌高度相關，因此HPV疫苗能同時預防此二者
  - (D)HPV疫苗可降低部分高危險型別感染風險
49. 有關兒童虐待的敘述，以下何者錯誤？
- (A)施虐者通常為陌生人
  - (B)虐待方式最常為身體虐待
  - (C)兒童身體經常有不明原因的外傷
  - (D)兒童可能會出現營養不良的狀況
50. 新生兒篩檢的代謝異常疾病，若未及時治療，哪一種與智力發展較無關？
- (A)葡萄糖-6-磷酸去氫酶(G-6-PD)缺乏症
  - (B)先天性甲狀腺功能低下(CHT)
  - (C)苯酮尿症(PKU)
  - (D)半乳糖血症(GAL)

51. 足月自然產後第二天的女嬰，目前有在哺餵母乳，血液檢驗報告總膽紅素值(total serum bilirubin)為11mg/dL，請問以下的照護或治療建議何者最適合？
- (A)為嚴重的病理性黃疸建議換血治療  
(B)可能為母乳性黃疸建議停止哺餵母乳改用配方奶  
(C)為新生兒常見的生理性黃疸可以繼續餵母乳及觀察  
(D)可能為核黃疸會造成急性膽紅素腦病變建議住加護病房觀察
52. 幫3歲以下幼兒滴耳藥，請問哪一個敘述錯誤？
- (A)藥物的溫度與體溫接近為宜  
(B)將耳垂向上向後拉能使耳道拉直  
(C)協助幼兒側臥使患耳向上  
(D)沿耳壁滴注藥物避免滴於鼓膜上
53. 有關兒童氣喘的敘述，何者錯誤？
- (A)氣喘發作會出現喘鳴音  
(B)最常見過敏原為塵蟎  
(C)類固醇經口吸入劑使用後要漱口以免口腔黴菌感染  
(D)家中最好使用地毯避免地板冰涼引起發作
54. 小明突然右下腹部肚子痛到保健室，護理師評估可能是闌尾炎，請問應該會出現哪些徵象？①麥氏徵象(McBurney's sign) ②羅氏徵象(Rovsing's sign) ③墨菲氏徵象(Murphy's sign) ④閉孔肌徵象(Obturator sign)
- (A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
55. 陳小弟6個月，出生後診斷為唇裂合併腭裂(cleft lip and cleft palate)，入院進行唇腭裂修補術，有關唇裂合併腭裂護理措施，下列敘述何者正確？①術後可採木乃伊約束法，避免抓或碰到縫線部位 ②盡量避免嬰兒吸吮，故安撫奶嘴暫時不能使用 ③可協助病童俯臥安撫情緒 ④若病童出現不停的吞嚥動作，應評估傷口處是否出血
- (A)①④ (B)②③ (C)①③ (D)②④
56. 關於5歲兒童面對死亡的反應，下列哪一項最常見？
- (A)明確理解死亡的不可逆性  
(B)將死亡視為一種懲罰  
(C)對死亡毫無反應  
(D)開始計畫與談論自己的喪禮
57. 小明罹患苯酮尿症(PKU)，護理人員指導媽媽相關的飲食衛教時，應告知小明要避免以下何種食物？
- (A)含乳糖的奶類食物，如母乳、牛奶及一般配方奶  
(B)含高鐵的食物，如葡萄乾、肝腎等內臟類、深綠色蔬菜  
(C)高糖份的食物，如高糖的蛋糕、蜜餞、水果  
(D)含蛋白質高的食物，如魚、肉、蛋、牛奶、豆類及所有麵粉製品等
58. 有關血友病(hemophilia)兒童的居家照護指導，下列敘述何者最為正確？①教導病童了解疾病，認識及判斷出血的徵象及控制出血的方法 ②學齡前期兒童可指導其學習凝血因子之皮下注射 ③適度運動可促進肌肉發展、強化關節穩定性 ④家裡需常備acetaminophen、aspirin、codeine等止痛藥物 ⑤刷牙應選用軟毛刷，以減少出血的機會
- (A)①②⑤ (B)①③⑤ (C)②③④ (D)①②③

59. 有關麻疹之敘述，下列何者錯誤？
- (A)由飛沫或直接接觸傳染，宜採呼吸道隔離
  - (B)發疹呈向心性分布，發疹順序為紅疹、丘疹、水疱及膿疱
  - (C)疹子消退後，皮膚可能出現色素沉著
  - (D)紅疹出現前2天，在口腔黏膜處出現柯氏斑
60. 有關水痘的敘述，下列何者正確？
- (A)同一時間內可在不同部位看到不同階段的發疹變化
  - (B)痘疹結痂前才具有傳染力，若家中有高危險成員(如嬰兒)須暫時隔離，痘疹結痂後即可正常互動
  - (C)疹子最早出現在臉部及頭皮，再向軀幹擴展
  - (D)可使用Aspirin以減少病童疼痛及發燒
61. 有關氣喘兒童居家自我照顧尖峰呼氣流速計(peak flow meter)，下列敘述何者錯誤？
- (A)平日可以由尖峰呼氣流速計監測肺功能
  - (B)氣喘發作時，呼吸道會變窄，因此尖峰呼氣流速(PEFR)值會上升
  - (C)採站姿，吹氣時尖峰呼氣流速計須與地面呈水平位置
  - (D)尖峰呼氣流速值達最佳值的80%以上，表示病童目前狀況控制良好，可維持正常的生活作息
62. 5歲的小華因右下肺葉肺炎入院治療，急性期發生呼吸窘迫症狀，下列護理措施何者較不適當？
- (A)維持組織氧合，給予氧氣、擺位、通氣與抽吸
  - (B)提供高濕度的空氣，並評估呼吸症狀
  - (C)協助採取左側臥，以緩解疼痛
  - (D)維持補充體液，且監測尿量
63. 10歲的小瑄患有第一型糖尿病，目前正接受居家管理，護理人員家訪時發現其近來因學校考試壓力，常忘記定時吃點心且活動量減少。下列哪項護理指導最適當？
- (A)不須在意飲食與活動，只要規律打胰島素即可
  - (B)避免外出活動以減少低血糖風險
  - (C)指導維持定時血糖監測並調整飲食與活動安排
  - (D)因學業壓力大，暫停監測血糖以免增加負擔
64. 5歲的小宇因川崎症住院接受免疫球蛋白治療後3天退燒，護理師發現其活動量增加，但食慾下降且主訴手腳仍有輕度腫脹。下列哪項護理措施最適當？
- (A)鼓勵劇烈運動以促進血液循環
  - (B)評估水分攝取與尿量，並密切觀察心臟徵象
  - (C)不需持續監測心音變化
  - (D)追蹤心臟狀況可等出院後6個月再考慮
65. 林先生因有攻擊行為被家人帶來住院，當天即攻擊病友，表示：「他是被派來要殺我的」，請問他的症狀最有可能為何？
- (A)誇大妄想
  - (B)被害妄想
  - (C)身體妄想
  - (D)忌妒妄想

66. 有關增強原則的敘述，何者正確？
- (A)食物是屬於次級增強物
  - (B)口頭稱讚是屬於初級增強物
  - (C)增強次數越多成效越好
  - (D)次級增強物比初級增強物更有增強效果
67. 躁症病人住院期間情緒易怒，且易受病友影響而生氣，請問以下何種活動安排最適合？
- (A)安排競賽性的團體活動以消耗體力
  - (B)安排短時間可以看到成果的活動再依狀況調整
  - (C)安排住在保護室以隔離病友的刺激
  - (D)提供安眠藥讓病人睡著減少生氣的機會
68. 下列有關精神疾病臨床症狀的敘述，何者正確？
- (A)對外界事務過度注意，甚至有警覺心，稱之為不恰當情感(inappropriate affect)
  - (B)對同一件事同時存在兩種相反的情感感受，稱之為易變情感(labile affect)
  - (C)病人情緒高昂，超出一般現實環境的過分陶醉現象，沉醉在該情緒不易抽離，稱之為欣快感(euphoria)
  - (D)情感遲鈍、面部表情少、對外界漠不關心，稱之為失快樂感(anhedonia)
69. 佛洛伊德(Freud)對偏差行為的看法，認為是早期發展衝突未能妥善解決的結果，此為運用下列何種模式？
- (A)人際關係模式
  - (B)精神分析模式
  - (C)行為模式
  - (D)溝通模式
70. 王同學16歲，診斷為思覺失調症，父母擔心服藥會影響其學科考試成績。下列護理措施，何者最適切？
- (A)引導家屬了解服藥的重要性
  - (B)告知家屬考試前可以先暫時停藥
  - (C)告知家屬症狀出現再服藥即可
  - (D)教導家屬使用轉移注意力來代替藥物使用
71. 張小姐，為太魯閣號列車出軌事件的倖存者，診斷為創傷後壓力症(posttraumatic stress disorder)，下列敘述何者正確？①症狀需持續六個月以上 ②會對出軌意外的原因或結果歸咎自己 ③不斷出現火車出軌的畫面 ④可能會出現口語或肢體攻擊性行為
- (A)①②③
  - (B)②③④
  - (C)①③④
  - (D)①②④
72. 魏小姐，32歲，診斷憂鬱症，第2次入院，情緒極度低落、平時亦總是皺眉、鬱鬱寡歡、失去活力，對過去的興趣或活動皆提不起勁。護理人員與病人會談時，病人認為自己是掃把星，害先生破產、是個不及格的媽媽，這是屬於何種防衛機轉的使用？
- (A)投射作用(projection)
  - (B)轉移作用(displacement)
  - (C)否認作用(denial)
  - (D)內射作用(introjection)
73. 關於恐慌發作的急性處置，護理師最應優先進行下列何項措施？
- (A)給予鎮靜劑並監測生命徵象
  - (B)陪伴並指導緩慢呼吸
  - (C)解釋發作原因以降低恐懼
  - (D)要求病人說明恐懼內容

74. 以下哪項策略最能延緩失智症患者生活功能退化？
- (A) 避免與外界接觸以維持安定
  - (B) 每日提供規律熟悉的活動與例行作息
  - (C) 限制日常活動以降低跌倒風險
  - (D) 提供自由選擇權以激發認知能力
75. 下列哪些行為符合注意力缺失過動症(ADHD)的診斷標準？①經常在別人說話時似乎沒在聽 ②常打斷別人或插話 ③社交互動明顯退縮或避免與人接觸 ④不喜歡或避免需要持續專注的任務 ⑤常常忘記帶重要物品
- (A) ①②③⑤
  - (B) ②③④⑤
  - (C) ①②④⑤
  - (D) ①②③④
76. 小美18歲，原本是個外向活潑的女生，最近一個月以來出現情緒低落、失眠、注意力不集中，表示活得很辛苦，不想去上學，成績明顯退步，經醫師診斷為憂鬱症，護理人員評估小美的護理問題時，下列敘述何者正確？①評估個案時須包括家庭之互動型態 ②成長早期發展過程與現在問題無關 ③需同時評估身體與生理之發展 ④可邀請學校老師會談以了解在校情形
- (A) ①②③
  - (B) ①③④
  - (C) ②③④
  - (D) ①②④
77. 一位躁鬱症病人處於躁期時，護理師與其溝通的最佳方式為何？
- (A) 給予長篇詳細的衛教
  - (B) 多與病人討論計畫未來
  - (C) 使用簡短、明確的指令
  - (D) 鼓勵病人自由表達想法
78. 一位強迫症病人每天洗手數十次且皮膚已紅腫，護理師初期最適當的作法為？
- (A) 立即制止洗手行為
  - (B) 規定其只能在指定時間洗手
  - (C) 協助討論焦慮來源並逐步協商減少洗手次數
  - (D) 附和病人表示多洗手很好
79. 有關自閉症之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 病童的言語溝通發展正常
  - (B) 罹患此障礙者男孩多於女孩
  - (C) 此障礙與兒童期思覺失調症不同
  - (D) 病童行為及活動模式受到侷限
80. 下列何者不是社區精神復健服務的主要目標？
- (A) 促進病人社會角色重建
  - (B) 提供長期機構收容
  - (C) 增強病人自我照顧能力
  - (D) 降低再住院率

# 114 年度臺中市政府所屬機關及學校護理人員 暨公立幼兒園契約進用護理人員聯合甄選

科目：綜合護理學科

選擇題（共 80 題，每題 1.25 分，共 100 分，答錯不倒扣）

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
B	A	D	C	D	A	B	B	C	C
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
A	A	B	A	D	B	B	A	C	D
21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
C	C	D	C	D	B	A	C	B	C
31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
C	B	B	A	A	A	D	B	B	D
41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
B	C	C	A	D	A	C	C	A	A
51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.
C	B	D	B	D	B	D	B	B	A
61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.
B	C	C	B	B	D	B	C	B	A
71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.
B	D	B	B	C	B	C	C	A	B