

經查詢後，總計有 11 筆資料符合您的查詢條件

荔枝 椿象類

普通名稱	含量	劑型代碼	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
丁基加保扶	48.340%(w/w)	EC	0.6-1.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥	7		21		避免於開花期使用。	延伸使用	1060106	
丁基加保扶	48.340 (w/w) (%)	EW	0.6-1.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥	7		21		避免於開花期使用。	延伸使用	1060106	
丁基加保扶	25.000%(w/w)	WP	0.8-2公斤	750	害蟲發生時開始施藥	7		21		避免於開花期使用。	延伸使用	1060106	
丁基加保扶	40.000 (w/w) (%)	WP	0.5-1.3公斤	1,200	害蟲發生時開始施藥	7		21		避免於開花期使用。	延伸使用	1060106	
亞滅培	20.000%(w/w)	SP	0.2-0.4公斤	4,000	害蟲發生時開始施藥	7		7		避免於開花期使用。	延伸使用	1060106	

普通名稱	含量	劑型代碼	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施用次數	安全採收期	施藥方法	注意事項	說明	核准日期	原始登記廠商名稱
賽洛寧	2.460%(w/w)	CS	0.3-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥	7		6		避免於開花期使用	延伸使用	1081004	
賽洛寧	1.000%(w/w)	WP	0.9-2.1公斤	700	害蟲發生時開始施藥	7		6		避免於開花期使用。	延伸使用	1060106	
賽洛寧	5.000%(w/w)	WG	0.2-0.4公斤	3,500	害蟲發生時開始施藥	7		6		避免於開花期使用。	延伸使用	1060106	
賽洛寧	2.800%(w/w)	EC	0.3-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥	7		6		避免於開花期使用。	延伸使用	1060106	
賽洛寧	2.800%(w/w)	SC	0.3-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥	7		6		避免於開花期使用。	延伸使用	1060106	
賽洛寧	2.500%(w/w)	ME	0.3-0.8公升	2,000	害蟲發生時開始施藥	7		6		避免於開花期使用。	延伸使用	1060106	