





幼兒、兒童及青少年(滿6個月至17歲)接種作業COVID-19疫苗¹

2022/07/19

| 疫苗種類/瓶身外觀 | Moderna COVID-19疫苗 濃度0.1 mg/mL  | Moderna COVID-19疫苗 濃度0.2 mg/mL  | Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗 兒童劑型  | Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗 成人劑型  | |
|-----------|---|--|--|---|--|
| 對象*及劑量 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 滿6個月至5歲： <ul style="list-style-type: none"> • 每劑抽取 0.25 mL • 每劑疫苗含量 25 mcg | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 滿6歲至11歲： <ul style="list-style-type: none"> • 每劑抽取 0.25 mL • 每劑疫苗含量 50 mcg ◆ 滿12歲至17歲 <ul style="list-style-type: none"> • 每劑抽取 0.5 mL • 每劑疫苗含量 100 mcg | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 滿5歲至11歲 <ul style="list-style-type: none"> • 0.9%無菌生理食鹽水注射液使用1.3 mL進行稀釋 • 稀釋後每劑抽取 0.2 mL • 每劑疫苗含量 10 mcg | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 滿12歲至17歲 <ul style="list-style-type: none"> • 0.9%無菌生理食鹽水注射液使用1.8 mL進行稀釋 • 稀釋後每劑抽取 0.3 mL • 每劑疫苗含量 30 mcg | |
| 接種劑次間隔 | <ul style="list-style-type: none"> • 滿6個月至5歲 基礎劑2劑 (間隔4-8週以上) | <ul style="list-style-type: none"> • 滿6歲至11歲 基礎劑2劑 (間隔4-8週以上) | <ul style="list-style-type: none"> • 滿12歲至17歲 基礎劑2劑 (間隔12週) 基礎加強劑 (8大類對象，與第2劑間隔至少28天) | <ul style="list-style-type: none"> • 滿5歲至11歲 基礎劑2劑 (間隔4-8週以上) 基礎加強劑 (8大類對象，與第2劑間隔至少28天) | <ul style="list-style-type: none"> • 滿12歲至17歲 基礎劑2劑(間隔12週) 基礎加強劑 (8大類對象，與第2劑間隔至少28天) 追加劑 (與前一劑次間隔至少150天) |
| (年齡範例*) | 111年7月25日接種，須為111年1月25日(含)以前出生 | > 105年(含)以前出生 111年5月25日接種，須為105年5月25日(含)以前出生 | > 106年(含)以前出生 111年5月25日接種，須為106年5月25日(含)以前出生 | > 99年(含)以前出生 111年5月25日接種，須為99年5月25日(含)以前出生 | |

*註：核對出生年月日足歲

幼兒、兒童及青少年(滿6個月至17歲)接種作業COVID-19疫苗²

➤ 依我國ACIP建議各劑次跨年齡接種COVID-19疫苗之接種建議

□ 接種間隔：依前一劑次接種時年齡之接種間隔

□ 接種劑量及廠牌：依該劑次接種時年齡之核准廠牌及接種劑量

| | 劑次 | 第1劑 | 第2劑 |
|----|------|----------------|------------------------------|
| 例1 | 年齡 | 11y11m | 滿12y |
| | 廠牌 | BNT-1 | BNT-2 |
| | 劑型劑量 | 兒童劑型 0.2 ml | 成人劑型 0.3 ml |
| | 接種間隔 | | 與第1劑間隔4~8週 (依5~11歲接種間隔) |
| | 劑次 | 第1劑 | 第2劑 |
| 例2 | 年齡 | 17y11m | 滿18y |
| | 廠牌 | BNT-1 | BNT-2 |
| | 劑型劑量 | 成人劑型 0.3 ml | 成人劑型 0.3 ml |
| | 接種間隔 | | 與第1劑間隔至少12週 (依12~17歲接種間隔) |