

112 年度臺中市政府教育局所屬學校護理人員及營養師 暨公立幼兒園契約進用護理人員聯合甄選

科目：綜合護理學

選擇題（每題 1 分，共 100 分，答錯不倒扣）

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
D	B	B	A	B	D	C	C	D	C
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
B	A	D	D	C	B	C	A	B	B
21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
A	C	D	C	A	A	A	A	A	D
31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
C	B	C	D	A	C	D	B	A	C
41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
B	C	B	D	C	D	D	D	D	A
51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.
B	A	D	A	D	D	D	C	C	B
61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.
C	B	C	B	A	C	A	D	D	B
71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.
D	B	C	B	D	C	B	B	B	C
81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.
B	B	A	B	A	A	C	D	B	A
91.	92.	93.	94.	95.	96.	97.	98.	99.	100.
B	A	D	A	C	A	D	B	D	B

112 年度臺中市政府教育局所屬學校護理人員及營養師暨
公立幼兒園契約進用護理人員聯合甄選

綜合護理學科題本

請不要翻到次頁！

讀完本頁的說明，聽從監試委員的指示才開始作答

※請先確認你的答案卡、准考證與座位號碼是否一致無誤。

請閱讀以下測驗作答說明

測驗說明：

112 年度臺中市政府教育局所屬學校護理人員及營養師暨公立幼兒園契約進用護理人員聯合甄選，綜合護理學科題本，題本採雙面印刷，共 100 題，測驗時間 90 分鐘，作答開始與結束請聽從監試委員的指示。

注意事項：

1. 所有試題均為四選一的選擇題，答錯不倒扣。
2. 依試場規則規定，答案卡上不得書寫姓名及任何標記。故意污損答案卡、損壞試題本，或在答案卡上顯示自己身份者，該科測驗不予計分。

作答方式：

請依照題意從四個選項中選出一個正確或最佳的答案，並用 2B 鉛筆在答案卡上相應的位置劃記，請務必將選項塗黑、塗滿。如果需要修改答案，請使用橡皮擦擦拭乾淨，重新塗黑答案。

請聽到鈴（鐘）聲響後再翻頁作答

試題公告
僅供參考

選擇題（共 100 題，每題 1 分，共 100 分，答錯不倒扣）

- 有關下列各疾病感染期間之建議隔離措施：①水痘採用絕對隔離 ②德國麻疹採用呼吸道隔離 ③腮腺炎採用腸胃道隔離 ④脊髓灰白質炎採用呼吸道隔離 ⑤麻疹採用呼吸道隔離。下列何者正確？
(A)①②③ (B)②③④
(C)③④⑤ (D)①②⑤
- 李小姐因懷疑有泌尿道感染，要留中段尿送檢驗，護理師關於步驟之指導，何者正確？
(A)指導留尿前，先以優碘棉棒由後往前消毒會陰部三次
(B)先解掉前段小便以沖洗尿道口，再以無菌容器盛取中段小便
(C)所需尿液量至少要120 c.c.以上，檢驗才有意義
(D)尿液標本需留置至少4小時以上，才能送檢
- 李小姐缺鐵性貧血的健康問題，關於鐵劑補充之敘述，下列何者錯誤？
(A)指導病人鐵劑可與維生素C一起服用
(B)植物性鐵劑較動物性鐵劑容易吸收
(C)鐵劑注射要採Z型注射法
(D)鐵劑注射後要觀察是否發生過敏現象
- 心肌梗塞(MI)的檢查診斷和照護，下列何者不正確？
(A)產生肺水腫已是Killip II程度
(B)troponin I 常用於確認急性心肌梗塞發作
(C)心電圖常見T波倒置
(D)胸痛後6小時內用血栓溶解劑最有效
- 教導糖尿病病人預防糖尿病足發生的護理措施，下列何者為錯誤？
(A)每日以溫水清洗足部；先以手背或溫度計測試水溫，以防燙傷
(B)可塗抹含酒精成分保養乳液或霜劑，以便快速乾燥
(C)若足部會大量出汗，可依醫囑輕灑一層足部用的粉劑
(D)可穿著棉襪，但每日得更換數雙
- 接受冠狀動脈繞道手術的病人，除了接受醫療措施外，還需配合衛教指導，下列何者選項為錯誤？
(A)配合改變生活型態
(B)加強罹病危險因子的控制
(C)學習如何改變行為
(D)維持靜態生活方式
- 陳先生因副甲狀腺功能亢進，而執行腫瘤切除術，術後醫療處置及注意事項何者錯誤？
(A)手術後醫師會給病人連續幾週口服碳酸鈣，以防因發生低血鈣
(B)預防手部周圍出現針刺感
(C)預防腳部出現針刺感
(D)預防手足抽搐症狀

8. 有關脊髓損傷所引起神經性膀胱的敘述，下列何者正確？
- (A)下運動神經元神經性膀胱訓練時，應教導病人引發反射性排尿的方法
 - (B)上運動神經元神經性膀胱訓練時，應教導病人以Crede's method 刺激排尿
 - (C)肛門反射及肛門外括約肌張力試驗呈陽性反應，表示S2-S4排尿反射中樞完整
 - (D)進行膀胱訓練時，當自解尿量：餘尿量=2：1 且餘尿量<150 mL表示訓練成功
9. 廖先生，53歲，有高血壓家族史，因工作關係經常應酬飲酒，沒有其他慢性疾病。此次因頭痛、血壓166/105 mmHg至醫院就醫，經診斷為高血壓，目前服用propranolol (Inderal) 及spironolactone (Aldacton)。有關護理指導，下列何者錯誤？
- (A)每日固定時間測量血壓，並記錄血壓值
 - (B)可能會有心跳速率降低的情形，需教導測量脈搏
 - (C)服用降血壓藥物需定時定量，以防反彈性高血壓
 - (D)需定期監測鉀離子濃度，並多攝取香蕉、柳橙、楊桃等
10. 有關愛迪生氏危機出現的症狀，下列何者錯誤？
- (A)低血容積
 - (B)高血鉀
 - (C)高血壓
 - (D)低血糖
11. 有關闌尾炎身體評估檢查的結果，下列何者錯誤？
- (A)麥氏點(McBurney's point)壓痛
 - (B)墨菲氏徵象(Murphy's sign)
 - (C)閉孔肌徵象(Obturator sign)
 - (D)普氏徵象(Psoas sign)
12. 下列何者是引起傷口感染的常見菌體？
- (A)葡萄球菌
 - (B)大腸桿菌
 - (C)沙雷氏菌
 - (D)白色念珠菌
13. 有關中風之相關敘述：①血栓性中風發生前通常會有暫時性神經功能缺損，稱之為暫時性缺血性發作 ②血栓性中風多發生在劇烈活動中，其臨床症狀與徵象的出現是間歇性、不穩定突然出現 ③肝素(Heparin) 是最常用來治療暫時性缺血性發作、血栓性中風、以及進行性中風之抗凝劑 ④若需長期服用抗凝血劑時，則多數是使用肝素(Heparin) ⑤每2小時協助病人解尿，最能協助其重建解尿的控制力。下列何者正確？
- (A)①②③
 - (B)②③④
 - (C)③④⑤
 - (D)①③⑤
14. 關於白內障，下列何者錯誤？
- (A)自覺視力減退、畏光、對顏色辨識力減弱、瞳孔變為白色
 - (B)藥物治療無效，必須靠手術治療
 - (C)眼內炎是術後最嚴重的合併症，會損害視力
 - (D)二度白內障不可以雷射進行後囊切開術，需要再度手術
15. 有關消化性潰瘍手術後的相關併發症：①胃排空變差 ②傾倒症候群出現在胃十二指腸吻合術後的機會多於胃空腸吻合術 ③便秘 ④貧血 ⑤鹼性逆流性胃炎。下列何者正確？
- (A)①②④
 - (B)②④⑤
 - (C)①④⑤
 - (D)②③④
16. 吳先生診斷為阿茲海默氏症，護理師項個案提供諮詢，下列何者敘述不恰當？
- (A)阿茲海默氏症與環境和腦質量減少皆有關
 - (B)對環境失去興趣多已是混亂期症狀
 - (C)目前藥物乙酰膽鹼為主要成分
 - (D)將日常生活圖案化可減少慢性混亂

17. 有關急性瀰慢性血管內凝血病人之實驗室檢查結果，下列何者錯誤？
(A)血小板減少
(B)纖維蛋白分解物(FDP)濃度增加
(C)纖維蛋白原(fibrinogen)濃度上升
(D)凝血酶原時間(PT)及活化部分凝血活酶時間(aPTT)延長
18. 有關庫欣氏症候群的診斷檢查，下列何者最具特異性？
(A) 24小時尿液游離皮質醇排泄量 (B)標準二天類固醇抑制試驗
(C)蝶鞍核磁共振影像檢查 (D)核醫腎上腺皮質掃描
19. 有關後天免疫缺乏症候群之敘述：①精液中的病毒濃度最高 ②會經由接吻和共用飲食餐具而感染 ③剖腹生產可以減少母子的垂直感染 ④胎兒出生之後禁止哺餵母乳 ⑤卡氏肺囊蟲肺炎是病人致死的主因。下列何者正確？
(A)①②③⑤ (B)①③④⑤ (C)②③④ (D)②④⑤
20. 有關支氣管鏡檢，下列何者正確？
(A)通常採用硬腦膜外麻醉
(B)病人要在檢查完後有出現作嘔反射才可開始進食
(C)檢查完之後痰中出現有血是一種正常的現象
(D)檢查之後提供病人熱敷將有助於預防或緩解喉部水腫
21. 王先生是建築工人，因椎間盤突出入院行腰椎椎板切除術，護理師提供之術後護理指導，下列何者正確？
(A)背架需使用3~6個月，只有睡覺及洗澡時可取下
(B)絕對臥床3日以上才可以下床活動
(C)出院後可立即恢復日常的活動
(D)使用柔軟的床鋪以減輕腰背部的壓力
22. 陳先生鼻部手術之後，從手術室回到病房，關於護理師執行的護理措施及指導之敘述，下列何者為錯誤？
(A)抬高床頭
(B)適度維持口腔清潔
(C)冰敷額頭，以減輕水腫
(D)兩週內勿用太熱的水洗臉及洗澡
23. 有關全髖關節置換術病人出院之護理指導，下列何者正確？
(A)採取等張肌肉運動以維持肌肉力量
(B)性生活、駕車等活動可在術後兩週恢復
(C)撿拾地上物品時，應以蹲下代替彎腰動作
(D)坐著時應保持雙膝分開，避免兩腿交叉
24. 李小姐視網膜剝離手術住院，有關出院前護理指導，下列何者錯誤？
(A)手術後六個月內應避免從事劇烈活動
(B)就寢應戴護目眼罩，白天外出應戴保護性眼鏡
(C)術後若視力改變，建議手術後一個月內更換眼鏡度數
(D)出院後需複診直到視力穩定為止

25. 有關截肢病人的照護，下列何者錯誤？
(A)術後一週內都要用枕頭抬高患肢，以防造成截肢處近心端的關節攣縮
(B)可在患肢的縫線周圍向縫線處，由外而內進行按摩
(C)起床後應立即穿上義肢，以減輕腫脹程度
(D)手術後立即使用彈性繃帶，以協助控制水腫
26. 陳小姐進行經蝶骨腦下垂體切除術，術後發現鼻部有水樣液體流出，下列護理措施，何者正確？
(A)利用尿糖試紙檢視分泌物性質
(B)將病人的床頭抬高30度
(C)用無菌的抽吸管吸乾淨
(D)用無菌棉球塞住鼻孔
27. 李小姐進行甲狀腺切除後，關於術後的護理措施，下列何者正確？
(A)觀察有無聲音嘶啞或持續吞嚥的動作
(B)禁止深呼吸、咳嗽運動
(C)喝溫開水減輕傷口不適
(D)給予頸部熱敷減輕不適
28. 顱底骨折常出現的徵象，下列何者錯誤？
(A)巴賓斯基氏徵象(Babinski's Sign)
(B)巴特爾氏徵象(Battle's Sign)
(C)鼓室積血(Hemotympanum)
(D)熊貓眼(Raccoon Eyes)
29. 林先生吃海鮮過敏，請問這是過敏反應種類的第幾型？
(A)第一型過敏反應
(B)第二型過敏反應
(C)第三型過敏反應
(D)第四型過敏反應
30. 上石膏病人的護理措施，下列何者為非？
(A)石膏變冷變硬時，將上石膏的肢體用軟枕抬高於心臟的高度
(B)若遠端皮膚呈現蒼白、冰冷，表示動脈循環受阻
(C)石膏症候群是因腸胃組織灌流改變所導致，是一種急性十二指腸阻塞之症狀，通常是上體石膏或髖部石膏病人之重要合併症
(D)近端皮膚變淡藍色或不正常腫脹，表示動脈循環不佳
31. 有關嗜鉻細胞瘤切除手術後之護理措施，下列何者錯誤？
(A)觀察術後出血情況與腸蠕動狀態
(B)依醫囑給予靜脈輸液，以維持體液容積
(C)注意高血壓症狀，必要時使用 α 阻斷劑
(D)監測每小時小便量，小於30 c.c./小時為異常
32. 有關自體皮膚移植病人的護理措施，下列何者錯誤？
(A)評估植皮區是否有出血，以防移植皮膚無法成功黏合
(B)術後供皮區須以壓迫性敷料加壓12小時
(C)供皮區癒合後可使用乳液軟化此區
(D)術後應保護植皮部位免受日照
33. 上石膏後24小時內病人的護理評估結果，下列何者應做立即處置？
(A)石膏肢體遠端有輕微水腫
(B)石膏肢體內皮膚搔癢
(C)石膏表面有灼熱點
(D)石膏肢體有酸味

34. 陳先生腿部接受靜脈曲張的手術，下列術後護理措施何者為非？
(A)手術治療後24小時內病人應臥床休息，並將患肢抬高15度
(B)術後彈繃需每8小時放鬆一次
(C)術後每小時在床上做全關節運動
(D)躺下時使雙腿低於心臟
35. 下列全肺切除術後護理措施何者為非？
(A)鼓勵及協助病人行健側肩部及手臂之運動，以防造成關節黏滯
(B)抬高床頭30~40度以促進通氣及有助胸管之引流
(C)鼓勵使用橫膈膜式呼吸或噁嘴式呼吸，有助預防肺擴張不全
(D)鼓勵病人深呼吸、咳嗽、翻身及攝入足夠液體以促進呼吸道分泌物之排除
36. 痔瘡切除術後照護措施，下列何者為非？
(A)可局部使用冰敷，以減輕疼痛
(B)手術後12小時可使用溫水坐浴
(C)開刀後採平躺姿勢，避免肛門傷口裂開
(D)建議病人攝取軟質及低渣飲食為主
37. 關於美尼爾氏症：①是迷路功能喪失的內耳問題 ②較常發生於40~60歲，會反覆地一再發作 ③耳鳴、單側感覺神經性聽覺喪失和眩暈是典型的三個症狀 ④噁心和嘔吐常伴隨著眩暈而發生，也可能出現內耳有壓力感 ⑤聽力檢查顯示病人是垂直型或高音型的聽障。下列何者正確？
(A)①②③⑤ (B)②③④⑤ (C)①③④⑤ (D)①②③④
38. 有關全喉切除術後病人之護理措施，下列敘述何者錯誤？
(A)坐起時，以手支托後頸
(B)排氣後，即可拔除鼻胃管
(C)採半坐臥，以減輕傷口腫脹
(D)增加飲食的色味，以彌補嗅覺的減弱
39. 下列何者為左心室衰竭早期常見的症狀？
(A)咳嗽
(B)端坐呼吸
(C)頸靜脈怒張
(D)陣發性夜間呼吸困難
40. 陳小姐患有骨質疏鬆，護理師給予其護理指導，下列何者錯誤？
(A)按醫囑服用動情素或是以動情素合併黃體素的處方
(B)適度日曬，每天補充維生素D
(C)減少身體活動，多臥床休息
(D)多喝乳製品
41. 當兒童在學校裡因癲癇有抽搐發作時，下列哪一項是校護應最先採取之護理措施？
(A)請其他學童離開教室
(B)移去週邊可能傷害病童的東西
(C)壓制固定其抽搐抖動的肢體
(D)將壓舌板置於嘴內

42. 護理師面對罹患心臟病之學童發生陣發發紺(blue spell)時，立即處理方式何者為正確：
- (A)請病童平躺放鬆
 - (B)通知病童家長接回家再就醫
 - (C)請病童蹲踞或採膝胸臥姿深呼吸
 - (D)請病童馬上服用毛地黃
43. 小美6歲，因扁平足（flat foot）就診，護理師提供之指導，下列敘述何者正確？
- (A)建議墊腳尖及跳躍，加強足背肌腱訓練
 - (B)使用矯正鞋墊配合矯正鞋，誘導足弓發育
 - (C)使用功能性鞋墊，預防足弓繼續塌陷
 - (D)建議考慮以滑膜切除術，預防阿基氏腱的短縮
44. 小明2歲，罹患重度海洋性貧血（Thalassemia），需反覆輸血。母親為印尼裔回教徒的新住民，中文溝通有限，有關以家庭為中心的護理，下列敘述何者最適當？
- (A)提供家庭以臺灣本土文化為主的翻譯版照護計畫
 - (B)完全配合印尼文化，進行所有病童與其家庭對疾病與住院的反應和需求照護
 - (C)在所有照護決策過程，請小明母親找尋其他家人幫忙
 - (D)在住院期間，儘量與家庭的文化習慣和常規保有一致性
45. 何小弟5個月大，因水腦症入院，為預防顱內壓升高，下列護理措施何者不適當？
- (A)密切觀察有無囟門鼓脹或噴射狀嘔吐現象
 - (B)抬高床頭30~45度，以降低腦內壓
 - (C)術後每2小時協助叩擊與抽痰，以預防吸入性肺炎
 - (D)給予安撫奶嘴以減少哭泣不安
46. 婷婷2.5歲，喜歡吸吮大拇指，但是擔心被母親發現，所以總是以另一手遮掩，婷婷覺得自己隱藏得很好，別人不會發現。她的行為是下列何種認知思考特性的表現？
- (A)可逆性
 - (B)去集中作用
 - (C)保留概念
 - (D)自我中心
47. 足月兒跟早產兒神經肌肉的成熟度的描述下列何者正確？
- (A)足月兒四肢可完全伸展或部分屈曲
 - (B)早產兒的前臂回彈恢復時間會比較短
 - (C)足月兒的膝關節窩角度大於90度
 - (D)早產兒的肘關節可超過身體的中線
48. 有關新生兒囟門的敘述，下列何者正確？①前囟門為菱形，由二塊額骨及二塊頂骨組成 ②後囟門為三角形，約出生後 20 週關閉 ③囟門若凹陷代表有脫水現象 ④胎頭之塑形現象（molding），2周後即可恢復
- (A)①②
 - (B)③④
 - (C)②④
 - (D)①③
49. 蔡小弟，2歲半，因腹股溝疝氣住院手術，出現術後疼痛狀況，應提供何種護理措施？
- (A)運用分散注意力方法減輕注意力
 - (B)提供玩具轉移注意力
 - (C)傾聽及鼓勵表達害怕及擔心的事
 - (D)以指引性的治療性遊戲協助了解即將進行的醫療措施及儀器

50. 依據皮亞傑(Piaget)的認知發展階段，下列何者為八歲小明的發展特性？
(A)能了解過去、現在及未來的時間關係與概念
(B)使用抽象的符號，並由一系列的觀察導出合邏輯的結論
(C)思考方式以自我為中心，可用圖畫方式表達想法
(D)開始學習到事件與象徵的關係
51. 目前在各大醫院所推行兒童發展遲緩篩檢評估是針對多大的兒童？
(A)3個月到6歲 (B)4個月到6歲
(C)6個月到6歲 (D)9個月到6歲
52. 針對兒童及青少年進行有氧運動應注意事項，下列何者為錯誤？
(A)同年齡的運動強度及時間是一樣的
(B)身體不適或疼痛時，要立即停止
(C)強調趣味及變化，不強迫接受過度訓練
(D)運動漸進負荷原則
53. 佩佩，2歲，罹患川崎氏病(Kawasaki disease)，有關臨床表徵，下列何者正確？
(A)自臉部開始至軀幹、四肢之順序脫皮
(B)持續發燒2-3天且軀幹皮膚出疹
(C)手掌及腳底泛紅，起水泡
(D)眼結膜充血、草莓狀舌
54. 阿明，10歲，因患有主動脈狹窄(Coarctation of the aorta)而住院進行檢查。有關護理評估，下列敘述何者錯誤？
(A)活動耐受性降低、疲倦、容易發紺且有杵狀指
(B)主訴常會有頭痛、暈眩、流鼻血且腳部冰冷
(C)觸診鼠蹊部的股動脈搏動很弱，甚至摸不到
(D)量血壓時上肢血壓高於下肢約10-20 mmHg
55. 粥樣瀉(celiac disease)是對蛋白質中的麩質過敏而導致吸收不良的疾病，下列何種食物不適合病童食用？
(A)蛋 (B)米飯
(C)玉米 (D)燕麥片
56. 小亮，8歲，患有第I型糖尿病多年，今因出現深而快的呼吸，臉色潮紅、口渴、噁心，入急診室診治，血液檢查結果可見下列何種情形？①血糖值：50mg/dL ②pH值：7.45 ③pH值：7.18 ④血糖值：600 mg/dL
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
57. 小芳，7歲，母親發現她的腹圍最近增大許多，經醫師檢查，確定小芳罹患威廉氏腫瘤(Wilm's tumor)，小芳手術前的護理措施，下列何者不適當？
(A)術前要特別監測小芳的血壓，注意高血壓徵候
(B)告訴家屬，小芳手術後還須做化學治療與放射線治療
(C)利用畫圖或可以移除腎臟的布娃娃，向小芳解釋她的病情與治療
(D)每日觸診小芳腹部，測量腫瘤大小，並用按摩方式，減輕腹部腫脹
58. 小琪，10歲，診斷為急性腎絲球腎炎，每天尿量約250 c.c.，血中尿素氮(Blood urea nitrogen, BUN) 100 mg/dL，有關護理指導，下列何者錯誤？

- (A)攝取低蛋白質飲食，以保護腎臟功能
(B)避免高鉀食物，以減少水分滯留
(C)攝取生酮飲食，以利腎絲球過濾
(D)嚴格限水，以控制水腫與高血壓
59. 黃小妹，8個月，8公斤，全身 30%的部分皮層燙傷，第一個24小時評估輸液為多少 mL 較適宜？
(A) 240 mL (B) 480 mL (C)960 mL (D) 1240 mL
60. 陳小妹出生時，沒有哭聲而且呼吸不規則；心跳速率為110次/分；其軀幹顏色粉紅但是手腳稍微發紫；四肢微彎；抽吸鼻腔黏液時，皺眉。其阿帕嘉計分統(Apgar Score System)的評估數值，何者正確？
(A)5分 (B)6分 (C)7分 (D)8分
61. 趙小姐罹患子宮內膜癌，下列敘述何者錯誤？
(A)常見症狀為不正常陰道出血
(B)是發生在子宮內最常見的癌症
(C)病人出現症狀時多已進入晚期
(D)診斷檢查以子宮內膜刮搔術(D&C)為主
62. 王女士 G1P1，陰道生產產後第3天，主訴感覺易緊張、抑鬱、沮喪感、失眠，有時會不由自主的掉眼淚。她目前最可能的情況為何？
(A)產後的正常現象
(B)產後情緒低落 (postpartum blues)
(C)產後憂鬱 (postpartum depression)
(D)產後精神病 (postpartum psychosis)
63. 下列對原發性痛經(dysmenorrhea)的描述何者為誤？
(A)通常是發生在初經來潮後1-3年
(B)其疼痛是陣陣的下腹絞痛
(C)月經期最初之72小時最為疼痛不適
(D)疼痛嚴重者可放射延伸到腰椎、後背部及大腿處
64. 更年期的雌激素減少對心臟血管方面影響,下列何者為非?
(A)高密度脂蛋白(HDL)減少
(B)低密度脂蛋白(LDL)減少
(C)低密度脂蛋白(LDL)增加
(D)高密度脂蛋白(HDL)不改變
65. 何女士，G1P0，因規則陣痛而入產房待產，子宮頸口開 2 cm，胎位為 ROA，station=0，下列何者為 station 0？
(A)胎兒的雙頂徑通過骨盆入口
(B)胎兒的胎頭在骨盆入口上方
(C)胎兒的胎頭接近骨盆出口
(D)胎兒的雙頂徑通過恥骨聯合
66. 趙女士，因流感服藥後才發現已懷孕 5 週，擔心服藥是否會影響胎兒健康，護理師為

- 能了解藥物是否影響胎兒，應當收集那些資料以供判斷？①藥物名稱 ②藥物服用時間
③胎兒羊水評估結果 ④藥物半衰期 ⑤過去懷孕史 ⑥家族遺傳病史
(A)①③⑤ (B)②④⑥ (C) ①②④ (D) ③④⑤
67. 為增進母嬰健康，自110年7月1日起，衛福部將產前檢查改變，下列何者敘述不正確？
(A)共可有2次超音波檢查（第8至16週及第28週）
(B)新增妊娠糖尿病篩檢
(C)貧血檢驗（第24至28週）
(D)增加至14次以降低妊娠與生產併發症
68. 懷孕8週的職業婦女經常反覆思考「擔任專職母親」或「繼續工作」，此種心境較符合下列孕期心理反應？
(A)不切實際的幻想 (B)注意力集中在自己
(C)內省與自戀 (D)矛盾心理
69. 懷孕婦女需瞭解胎動次數與強度的變化，通常建議於正常妊娠幾週起每天記錄胎動情形？
(A)14週 (B)18週 (C)22週 (D)28週
70. 下列何種情況不適宜哺餵母乳？
(A)母親為B型肝炎帶原者 (B)嬰兒有半乳糖血症
(C)母親有乳腺炎 (D)嬰兒有先天性心臟病
71. 黃女士陰道檢查結果子宮頸擴張9公分，變薄程度80%，高度+2，此時胎頭最有可能在下列那個位置？
(A)陰道出口 (B)骨盆入口 (C)坐骨棘上 (D)坐骨棘下
72. 有關精液檢查之護理指導，下列何者正確？
(A)取精後以冰塊維持7°C以下送檢 (B)取精後室溫1-2小時內送檢
(C)保險套直接收集精液送檢 (D)取精後保溫42°C送檢
73. 有關萎縮性陰道炎之敘述，下列何者錯誤？
(A)常見於更年期後或卵巢切除婦女
(B)陰道酸鹼度增高有利於其他菌種生長
(C)因黃體素缺乏使陰道黏膜萎縮、上皮變薄
(D)主要症狀為陰道分泌物、外陰搔癢與刺痛
74. 婦女懷孕期間，胎盤所分泌的荷爾蒙：①雌性素 ②黃體素 ③人類絨毛膜性腺激素 ④催產素 ⑤前列腺素。下列何者正確？
(A)①④⑤ (B)①②③ (C)②③④ (D)②③⑤
75. 護理學者魯碧(Rubin) (1984)提出孕婦於妊娠期間的四項母性任務，下列何者為錯誤？
(A)確保母子安全 (B)確保重要家人接受新生兒
(C)學習貢獻自己 (D)自我生理需求的滿足
76. 有關婦女懷孕的徵候，下列何者正確？
(A)月經沒來為可能徵候 (B)胎心音測得為可能徵候
(C)胎動初覺為疑似徵候 (D)妊娠紋的出現為確實徵候
77. 採用全素食之孕婦，容易缺乏下列何種營養素？
(A)維生素B12、鋅、維生素D (B)維生素B12、鋅、鐵
(C)維生素C、維生素B12、鐵 (D)維生素C、鈣、維生素D

78. 多囊性卵巢症候群(polycystic ovary syndrome)的婦女體內常發現有分泌過多的？
(A)雌性素 (B)雄性素 (C)黃體素 (D)促濾泡成熟激素
79. 產婦第二產程用力時，護理人員採取何種做法較能夠保護會陰的完整性？
(A)讓產婦閉氣向下使力
(B)引導產婦哈氣以控制胎頭的娩出
(C)將無菌治療巾放在胎兒的頭部來施壓
(D)接生者的手向產婦的會陰施壓
80. 陳太太懷孕38週，醫師安排進行無壓力試驗，試驗結果為反應型。根據此結果，下列敘述何者錯誤？
(A)試驗時間約30分鐘
(B)在20分鐘內至少有2次的胎心率加速
(C)胎動時，胎心率每分鐘會增加10次
(D)胎心率加速持續超過15秒以上
81. 關於思覺失調症(Schizophrenia)的負性症狀(negative symptoms)，下列何者為正確？
(A)被害妄想 (B)表情淡漠
(C)聽幻覺 (D)思考被廣播
82. 張同學被診斷為自閉症類群障礙症，某日於團體治療時聽見救護車經過的聲音隨即尖叫拍打頭部，下列何種處置較合宜？
(A)鼓勵他用言語表達感受 (B)暫停其課堂活動給予短暫隔離
(C)引導團體成員給予支持 (D)依醫囑提供鎮定藥物
83. 小明為家中獨子，父親是成功企業家，因工作忙碌常不在家，對小明要求高，少稱讚。小明上國中後開始熱衷追逐、模仿某偶像的穿著舉止，曠課多日且計劃出國追星，此行為最可能是下列何項心理防衛機轉？
(A)仿同作用(identification) (B)幻想作用(fantasy)
(C)反向作用(reaction formation) (D)取代作用(substitution)
84. 對有聽幻覺(auditory hallucination)、被害妄想的病人進行溝通時，下列護理師的回應何者較適當？
(A)你說有人要害你，其實這是你的想像
(B)這裡除了我和你，並沒有其他人在說話
(C)你說有人害你，可是你還活得好好的
(D)這是你幻聽、妄想的精神症狀，藥物可以改善
85. 十歲的陳同學，因智能不足，在學校常與同學發生衝突並出手打壞同學的眼鏡，護理師對於其暴力行為擬定行為修正約定：如果一天都沒有出現任何肢體攻擊，下列處置何者最適當？
(A)可獲得三張波利的娛樂點數
(B)不用罰寫國語課本的內容
(C)取消下課後整理課桌椅的規定
(D)紀錄三天皆能遵守約定，才給與文具獎勵
86. 有關創傷後壓力症(post-traumatic stress disorder; PTSD)病人的治療處置，下列何者較適當？

- (A)若採用認知治療，治療重點為引導病人修正對創傷事件起因與結果的扭曲認知
(B)若採用精神分析治療，治療重點為採用家庭系統學說來說明家庭間病態的溝通
(C)若採用行為治療，治療重點為以洪水法協助病人逐步控制侵入性的創傷事件影像
(D)若採用藥物治療，治療重點為以鋰鹽來緩解病人情緒症狀
87. 有關注意力不足/過動症 (ADHD) 的照護原則，下列何者最不適當？
(A)安排活動以疏導其過多的活動力
(B)儘量避免選擇需非常專注的靜態活動
(C)活動無法持續時應立即終止，以減少挫折
(D)不宜安排過度攻擊的活動，以防造成傷害
88. 陳女士說我活著只是造成別人的困擾，可以讓我趕快死嗎？護理師對陳女士的應該如何回應？
(A)你家人有跟你說什麼嗎？為什麼你會這麼覺得
(B)我們出去走走？讓你不要想東想西
(C)要不要談怎麼樣活著比較重要
(D)為什麼有這種想法？你的想法已經持續多久了。
89. 吳先生在公眾場合說話感到緊張不安甚至胸悶，覺得大家都在嘲笑他，所以常常宅在家，避免公眾活動，吳先生最有可能的診斷為何？
(A)恐慌症 (panic disorder)
(B)社交恐懼症 (social phobia)
(C)廣泛性焦慮症 (generalized anxiety disorder)
(D)強迫症 (obsessive compulsive disorder)
90. 個案長期物質濫用導致停用後有發汗、虛弱無力、腹痛和骨頭痛、失眠。最可能是以下哪種物質的戒斷反應？
(A)海洛因 (heroin) (B)大麻類(cannabinoids)
(C)K他命 (D)古柯鹼(cocaine)
91. 陳先生躁症發作對於性的興趣增強，白天經常碰觸女病人，夜裡病患醒來如廁，夜班護理師未加以注意，之後發現病人潛入女病室並和一位慢性思覺失調症病患發生性行為；此事件對於這位夜班護理師依據法律的刑法責任為？
(A)有所不為 (B)懈怠過失 (C)有認識過失 (D)疏虞過失
92. 有一位精神科病患表示自己具備超能力，能透視別人內心的想法，此為下列何種思考內容障礙？
(A)誇大妄想 (B)關係妄想 (C)怪異妄想 (D)虛無妄想
93. 護理師將照顧的個案視作自己過世的父親，經常烹煮父親生前愛吃的食物給個案，此種現象符合下列個案或護理師可能出現的情緒反應？
(A)正向情感轉移 (B)負向情感轉移 (C)負向情感反轉移 (D)正向情感反轉移
94. 常應用在兒童、青少年、老年人及精神患者的寵物治療，下列何者不是寵物治療協助改善的問題？
(A)行為問題 (B)情緒問題 (C)認知問題 (D)創傷
95. 鋰鹽(lithium)是治療雙相情緒障礙症(bipolar disorder)之重要的情緒穩定劑，當病人持續使用鋰鹽治療時，必須定期醫療檢查的項目，下列何項正確？①肝臟功能 ②肺臟功能

③腎臟功能 ④甲狀腺功能

(A)①②

(B)②③

(C)③④

(D)①④

96. 許先生最近出現情緒高昂、易怒、誇大想法、多話、注意力分散、睡眠時數少，請問以上這些症狀需持續多久時間才能診斷為躁症發作(manic episode)？

(A)一週

(B)二週

(C)三週

(D)四週

97. 下列關於治療注意力不足／過動症藥物methylphenidate (Ritalin®)的描述，何者正確？

(A)可以刺激三酸甘油酯的代謝

(B)每2個月需計畫性停藥一次

(C)血壓降低為常見的副作用

(D)可促進多巴胺的釋放

98. 吳先生被診斷為思覺失調症(schizophrenia)，正持續服用第二代抗精神病藥物clozapine (Clozaril®)中，護理師給予身體健康狀態的評估時，應注意評估該藥物的副作用：①口水過多 ②顆粒性白血球缺乏症 ③體重增加 ④低血糖 ⑤代謝症候群。下列何者為正確？

(A)①②③④

(B)①②③⑤

(C)①②④⑤

(D)②③④⑤

99. 有關自殺行為之事件，下列何者錯誤？

(A)憂鬱症個案在憂鬱狀況好轉時，卻是執行自殺的危險時刻

(B)老人的自殺機率是一般成年人的2倍

(C)憂鬱症是臨床上造成自殺行為的主要精神疾病

(D)自殺的強度與憂鬱程度呈正相關

100. 有關自我了解，在周哈里窗中，他人知道但是自己卻不知道的是屬於哪一區？

(A)開放區

(B)盲目區

(C)隱私區

(D)未知區

試題公告
僅供參考